

Medyc. pol. 3003.

Anne Inception qui
mater adultum fuit

Hunc pater aduultus

Hole liquesce et erit

Ex litris Stanislas

Roszkowski

Ex libris c. M. Michaelis
Devonshi AD et P.

1886. IX. 29.

25
19 86

W. R. R. R.

42909
I



SE

R

In q
doc
r

M

T

Ca
9
B
D
ex

SEBASTIANI SLESZKOWSKI

Philosophiæ & Medicinæ Doctoris,

DE
FEBRIBVS
LIBER;

In quo earum causa, signa, prognoses, curatio, iuxta
doctrinam Hippocratis & Galeni Principum, alio-
rumq; posterioris ætatis celebriorum, ac etiam
praxim selectam, atq; singularem, quo-
rundam huius ævi expertissimorum,
Medicorum, cum breuiter, tum
sufficienter, traduntur.

Non solum Medicis ad curandum; verum
etiam reliquo omni hominum gene-
ri ad præcauendum, appri-
me utilis, ac necessarius.

CRACOVIAE,

Typographo Stanislao Giermaniki, 1616.

Bibliotheca Stanislao Giermaniki
Ex libris Stanislao Giermaniki
Donatus de libro vito, qui cum subrip-
erit Stanislaus legio

IN ARMA
GENTILITIA DOMVS
COMOROVIORVM.



A Rma haec quid dicant? magnos virtute Dynastar,
 Excelsa meritis laude sub astra vehi,
 Fortes magnanimo varijs per sepe periculis
 Pectore durarunt ritu Comorovij.
 Publica priuatis auxerunt commoda rebus,
 Idcirco chari Regibus, & Patrie.
 Inter quos Petrus firmus, constansq; sacrata
 Religionis amans, Martis & artis honor.
 Excelsa virtute potens, cordatus in hostem
 Prorumpens, claret consilio, ore, manu.

PERILLVSTRI
ET MAGNIFICO
DOMINO,
D. PETRO
KOMOROWSKI

A KOMOROW

COMITI
IN LIPTOW
ET ORAVA

CAPITANEO
OSWIECIMEN.

&c. &c.

Domino suo Clementissimo,

SEBASTIANVS SLESZKOWSKI

Libens, lubensq; inscribit, & dicat.



Agnum munus esse cen-
seo, Perillustri Domine,
de genere humano mereri: id est,

(A)

2

multorum

EPISTOLA

multorum aliò flexas mentes ad
metam illam Publici Boni ducere,
dirigere, vnàq; cum vita, & salute,
seruare, atq; retinere. Reuera enim
in hoc vno nostra felicitas sita,
vt Publica salus salua, & integra,
constet; atq; etiam optimus quisq;
nascitur, non vt moliter sese curet,
sed vt per ipsam salutariter & publicè,
& priuatim viuatur. Cæterum dum hoc
ipsū censeo, etiam simul facio, quia ex
illa sciētia, quæ maxime bono totius
Vniuersi cōfert, scilicet, arte Medica,
præcepta vel imprimis necessaria, atq;
ex illis consilium; vsui vitæ humanæ
in publicum emitto. Non est profectò
alia supra hanc sciētia, quia reliquæ
omnes nec semper, nec omnes in
vsu: hæc necessariò omni ordini,
sexui;

DEDICATORIA

sexui, ætati, ex quibus totum hoc
 magnū cōponitur corpus. Sua-
 for est virtutum Medicus, dum e-
 nim vitam cuiuspiam curat, pri-
 mō animum à vitiorum colluue
 expūrgat, crapulam remouet, irā,
 tristitiam, socordiam, & omnem
 luxum in omni re prohibet; sed
 etiam vitam, salutemq; cōseruat,
 dum labefactatas cordis vires re-
 ficat: cerebri spiritus fulcit, atq;
 sustentat: mentis organa perpur-
 gat: expollit ingenium, recreat
 memoriam, atq; totum corporis
 statum in meliorem commutat
 formam. Nouit enim admirādā
 rerum creatarum vim, nouit cau-
 sas morborum, & modos auertē-
 di morbos; atq; ita aut singulis
 rebus, aut varia variarum tempe-
 rie omnem ab humano genere a-

*Medicus
per suadet
distans*

(A) 3

uertit

EPISTOLA

uertit intemperiem, aut iam ortam eradicat. Medica profectò scientia eius est virtutis,

Possit vt in cælum manes reuocare sepultos,

dum vitam iam penè extinctam in statum sanitatis pristinae reuocat. vitam ipsi debemus, & à nobis certatim stare antiquos video, qui Medicos, vt Apollinē, Aesculapium, Machaonem, Asclepiadē, & alios innumeros, quos hīc raceo,

Diuorum altaribus augent,
verū etiam omne æuum, vetus, medium, nostrum, huic magnæ scientiæ principem ubiq; tribuit locum, & eius cultoribus præmia. Et hæc prima causa est, Perillustris Domine, ob quam ipsius scientiæ præcipuam partem illustri

DEDICATORIA.

ſtri Tuo Nomini Dico; præcipuâ
dico, quia de Febribus eam inſcri-
bo, in eaq; cauſas Febriû, ſigna,
prognofes, modum curandi, ape-
rio; qui quidem morbi omnium
frequentiffimi, acutiſſimi, & om-
nibus propè acutis adnexi, pluri-
mos faciunt calcare viam lethi,
niſi peritè ipſi calcentur, & tol-
lantur. Addo aliam, ſcilicet, hîc
me lucē quærere tenui luci meæ
ab illuſtri Tuorum, Tuaq; luce.
Quidni? Reuera non multas in
vniuerſo terrarum orbe Gêtes vi-
deo, quæ cum Gente Tua, vel
antiquitate, vel rerum geſtarum
gloria, quæât comparari. Etenim
alta ab origine per Comites à Li-
ptow, & Oraua, deriuatus in Te
ſanguis natales Tuos inſtruit, &
Gentem dignitati fatalem in in-

EPISTOLA

elyto Poloniæ Regno, per longos (quos prudens omitto) Nepotes ad Petrum Comorouium feliciter transmisit: Vir hic fuit verè magnus inter magnos, vtpote quem magnitudo animi, & prudentia, cuius vtriusq; egregium specimen dedit in publicis, iisq; arduis, negotiis; imò ipsa
ardens euexit ad æthera virtus.

Namq; dum Vngaria Casimirum Casimiri Regis Poloniæ Filium in Regē deligit, & rursus in Mathiam mentes flectit, magni Princeps animi Casimirus contemnit: in Poloniam redit, & dum nulli bi propter

varios casus, & tot discrimina rerum,

cum suis consistere audeat, à Petro

quem

DEDICATORIA

quem liquidus Fortunæ riuus inaurat
 omni munere Diuū,
 hospitio Gelauix multos dies,
 Rosenbergæ itidē multos, splen-
 didè, & magnificè, excipitur, atq;,
 ob hanc ipsam rem, Petrus à Mat-
 thia Rege bonis omnib⁹ exutus,
 in Polonia, ob virtutem, atq; fi-
 dem, in Casimirum, territorium
 Crasnostauien. accipit, & Ziucci-
 um per suos posteros hucusq; re-
 tinet. Magna vis sāguinis, atq; ori-
 ginis. Fertur enim cursu perenni
fontium vena vitalis ab hoc ipso
 in Christophorum Auum Tuum
 Castellanium Oswiecimen. Quid
 hic? Magnus Toga, Sagoq; fuit,
 quia & in cōsilio id tenuit, quod
 rectum, & in bello, quod Rei-
 pub. salutare. Positus enim in fi-
 nibus Regni in vsum eius Boni

EPISTOLA

Publici excubias egit, & hostem,
quoties se obtulisset

Fudit Eques metuendus hasta.
Iam Christophorus Pater Tuus
Castellanus Sædecen. nostrum vi-
xit æuum: nouimus quantus ille
vir, nouimus prudentiam, virtu-
tes, facta, laudes exprimere non
possumus, & silemus; sed ita, vt
toto reliquo corpore velato, ca-
put ostendamus.

Hic vir, hic est Diuûm genus.
quia facta eius, atq; virtutes verè
diuinæ, ob quas in sancti' Cōsili-
um, quod stat^s, & rerû, vocât, adsci-
tus, id est, auct^r Senatoria dignita-
te, eâ sustinuit, cum fauore, laude,
plausu. Diuinitas quædâ videtur,
& fuit profectò hæc dignitas in eo
*Nam consulta Patrum, nam le-
ges, iuraq; seruans,*
saluta-

'DEDICATORIA'

salutariter, & ex usu Publico illā
habuit. Etenim ad mentem De-
mosthenis naui Reipub. salua,
promptè consuluit, & prouidè:
quia postquam fluctus exuperat,
inane est studium. Consuluit se-
riò, & non properanter: quia fe-
stinatio est cæca. Vidimus, vide-
mus, videbimus, bona cōsilia mo-
rā valescere; maximè apud eum,
cuius consilii gubernaculum lex
diuina. Et sanè magnum in Sena-
tore, atq; vtile, munus, vt ex men-
te Solonis consulat non suauis-
sima, sed vtilissima, ille fecit; sed
tēpestiuè: quia frequēter saluberri-
ma medicina abit in perniciē data
nō opportunè; sed cōstāter: quia
vacillatio est certū signū nō certæ
mētis. Ah vtinā ipsi in his virtuti-
bus plures similes, qui gradu si-
miles!

EPISTOLA

miles! Non verear dicere, illorum ornamēto, Reipublicæ præsidio, id fore; & consultius, atq; felicius, quædam administratum iri. Taceo reliqua. quia non facile exitum reperio, si semel penetro in hoc profundum rerum ab eo gestarum. Ad te, Perillustriſ Domine, venio, qui ab hac aurea arbore verè aureus es ramus.

Fortes creantur fortibus & bonis,
neq; Tu Tuorum Maiorum lucem imminuisti, imò auxisti, statim ab ineunte ævi flore, & magis auges. Gloriam sanè non in facili putas, iuxta illud:

Ardua per durum gloria raudit iter;

& Te ad dura iam olim à teneris exciuit. Namq; è castris Mineræ egressus, ostendisti, fortes, & constan-

DEDICATORIA.

constantes animos non ad quie-
tem inuitari, sed ad labores in
Republica suscipienda suscitari.
Et hinc est, quod & in Cōmuni
illo Motu Cūili iūxisti Te gregi
tuo: id est, bonis, & Regi, pro sa-
lute Boni Publici. Comes virtuti
honos, comes Tibi, qui per tem-
plum *Virtutis* ad templum *Ho-*
noris

Quò Te cælestis sapientia duxe-
rit, ire

haud cessas, & iam ingrederis,
magisq; talis esse pergis. Præfe-
ctura enim insignitus Oswicci-
men, dignitatem hanc habes sine
iactantia, procacia, vanitate. Nam-
que vtramque illam diuam iusti-
tiam nempe, & Clementiam, rectè
sequeris. quia omnibus tribuis,
quod suum est, id est, meritis præ-
mium,

EPISTOLA

mium, noxiis pānam; sed etiam
simul lenis, & temperas, etiam no-
xios eripis, lapsos erigis. Maçtē
hac mente Tua, quam adgnatam
scio non nisi optimæ cuiq; menti,
perge in hoc tali passu fidenter:
quippe vtraq; hæc

*Est summa virtus, petitur hac cæ-
lum via.*

Petist tu, Perillustris Domine quia
dignitatem Tuam ex usu Boni
Publici habes. Mehercle pro-
cul à Te rei Tuæ studium, qui re-
ctē censes res priuatas semper of-
fecisse, offecturasque, publicis: &
præcipuum veri iudicii venenū,
Reipublicęq; interitū, suā cuiq; v-
tilitatem. Iam in alta fortuna non
abripi licentiæ vētis difficile est:
quia inter tot obsequia Fortuna nō sa-
tis cauta mortalitas. Non abriperis,
Perillu-

DEDICATORIA

Perillustri Domine, quia in omnibus moderationem seruas, & hac salua, insertam habes gravitatem in vultu, auctoritatem in verbis, & factis; simul etiam comitatem, & humanitatem: illas venerabiles, istas amabiles, ob quas Polonia nostra in Te duplici isto fertur affectu *Venerationis* pariter & *Amoris*. Feror & ego, quia cum iam olim multis ab hinc annis nobilissimam Domū Tuam candido amore sim complexus, illiusque singulares Perillustribus Tuis Fratribus, viris magnis, & ad magna natis, indices notas, vigilis mei laboris, & stili, exhibuerim, nunc idem facio, dum Tibi, Perillustri Domine, hunc foetum ingenii mei consecro ab hac tertia causa. Accipe itaque

EPISTOLA

itaque Perillustri Dominē, qui
 bonas Musas, & cum Musis fili-
 os, aut cultores, Musarum, & ipsi-
 us Dominę Sapientię, amas, hoc
 veluti animi, cultusque mei in Te
 pignus: accipe me ipsum, & id,
 quicquid est ab ingenio meo, me-
 que contra susurros tuere, & ra-
 diis benevolentię Tuę ad ma-
 iora attolle, iuua, promoue. Ego
 vires ingenii mei, in cultum, lau-
 demque Tuam, & nobilissimę
 Gentis Tuę, offero. XI. Calen-
 das Martij. CIO. IOC. XVI.

F

In qu
 do

N



D E

FEBRIBVS LIBER.

*In quo earum cause, signa, prognoses, curatio, iuxta
doctrinam Hippocratis & Galeni principum, alio-
rumq; posterioris ætatis celebriorum, ac etiam
proximæ selectam, atq; singularem, quo-
rundam huius æui expertissimorū,
Medicorum, cū breuiter, tum
sufficienter traduntur.*



*Non solum Medicis ad curandum; verū
etiam reliquo omni hominum gene-
ri ad præcauendum, appri-
mè utilis, ac necessarius.*



FEBRIBAS

LIBR.

In quo causae, signa, prognostici, et ratio inveniuntur
libri. Hic tractatus est de febribus, et de
causis, signis, et prognosticis. Hic tractatus
est de febribus, et de causis, signis, et prognosticis.

Non solum medicis ad curandum, sed etiam

etiam ad cognoscendum et apponendum

remedia, et ad colligendum rationes

et ad colligendum rationes, et ad colligendum

rationes, et ad colligendum rationes, et ad colligendum

rationes, et ad colligendum rationes, et ad colligendum

rationes, et ad colligendum rationes, et ad colligendum

rationes, et ad colligendum rationes, et ad colligendum

AL de
cipe, et
in lucem
aut ven
Galenus
Scilicet
et meip
ma, exc
commen
quartun
litati,
pessimu
mus, et
xus, plu

Namq;
nimirum
operatio
non sua
sed et
magnitu
hunc me
RE hab

✻
A V C T O R
L E C T O R I
S.

Alterum ingenij mei, benigne lector, scetum
de Febribus, morborū omnium morbo prin-
cipe, & comite, Deo auspice, cui omnia debeo,
in lucem emitto. Et quidem huc me non ambitio,
aut ventus nouitatis, pellexit; sed ea, quas habet
Galenus 7. Meth. meden. ad Eugenium, cause.
Scilicet hac in re & vrgentibus amicis gratificor,
& meipsum ad rem propositam, ratione vtilissi-
ma, excito, & ad obliuionem (ex mente Platonis)
commentarios mihi repono; verū etiam (vt
quartum addam) vsui, & publicæ omnium vti-
litati, consulo. Omnis morbus malus: Febris
pessimus, quia omnium frequentissimus, acutissi-
mus, & quod maius, acutis prope omnibus adne-
xus, plurimos

mortis limen adire coëgit.

Namq; cæteri ferè omnes vnā duntaxat partem,
nimirum animalem, aut vitalem, aut naturalem,
operationem impediunt, vel ledunt: febris omnes,
non sua tantū violentia, ferocitate, malignitate,
sed & suorum symptomatum multitudine, atq;
magnitudine. Vide hic magnum, atq; vtile esse,
hunc morbum nosse, atq; curare: & in hoc OPE-
RE habes, quia de Febribus illud inscribo: id est,

AD LECTOREM.

diuersas Februm naturas, ipsarumq; causas, signa, prognoses, & modum curandi, scribo, explicando partem affectam, & affectum ipsum, ita ut nihil in hac materia deesse videatur: quod quidem nullum ante me ita fecisse constat. Sanè enim omnia hæc magna cum diligentia facio, quia quæ in hoc genere morbi à probatissimis auctoribus excerpsti: à præceptoribus hausi: longo rerum usu, ac experientia, probata accepi: quæq; maxime sub hac cæli constitutione hominum degentium naturis, euo, consuetudini, seruire obseruau, candidè absq; omni fūco, omni posteritati in hoc OPVS redigo: nihil veritus Momum, aut calumniantem, quia talibus insitum alijs clanculum obmordere, cum ipsi nihil producant in publicum usum. Non verò hic expectabis disputationes accuratas, aut exquisitam stili elegantiam, quia non inanibus verbis; vsui, prouidi, & Medica Ornari res ipsa negat contenta doceri. Quare, benigne lector, laborem nostrum, & quicquid est ab ipso, candidè accipe, contraq; susurros defende; sed etiam me cum hac, quæ est ab ingenio meo, prole, ama, & feliciter vale.



DE

FEBRIBVS LIBER.

In quo earum causa, signa, prognoses, curatio,
iuxta doctrinam Hippocratis & Galeni princi-
pum, aliorumq; posterioris ætatis celebriorum, ac
etiam praxim selectam, atq; singularem, quorun-
dam huius æui expertissimorum, Medicorum, cum
breuiter, tum sufficienter traduntur.

✽ ✽ ✽

Non solum Medicis ad curandum; verum
etiam reliquo omni hominū generi ad præ-
seruandum, apprimè utilis, ac
necessarius.

✽ ✽ ✽

Prefatio.



Febres iure merito primum sibi locū Febres
inter reliquos omnes corporis affe- quales
ctus vendicant. Sunt enim febres mor- morbi.
bi tum vniuersales, tum frequentissi-
mi, tum diligenter Medico considerandi.

Vniuersales quidem, quoniam non vnā ali-

M m

quam

De febr. in genere

quam partem duntaxat, quemadmodum pleræque
agritudines ceteræ, affligunt, sed vniuerso corpo-
ri exhibent negotium: idcirco, quia actiones omnes
vitales, animales, naturales, ledere consueuerunt.
Et tandem etiam, quia natura illarum ubique, serè
in corpore tam intra, quam extra venas, coacer-
uari potest.

Febres præterea sunt aliorum morborum fre-
quentissimi, tum quia vel sole per se inuadunt, vel
alijs grauissimis agritudinibus, per paucis omnino
exceptis, ceu comes indiuiduus, iunguntur. Quod
non ignorans D. Hippocrates ait, ubi nulla sit ac-
ris constitutio pestilens, qui pereunt, serè ab acu-
tis febribus perire. Postremo magnam considera-
tionem, & præ alijs, Medici requirunt industri-
am, maximèq; momenti meritò censentur ob affe-
cte partis præstantiam, quæ (vt inferius dicitur)
est ipsumcor, arx vitæ; cuius pathemata periculo
vacare haud queunt.

I. de rat.
vict. acut
l. 8. & 9.

Romani
Febribus
sacra fe-
cerunt.

Qui scit
tractare
febres ma-
gnam

partem
Medici-
nae scit.

Legimus sanè Romanos olim Febri, tanquam
morborum formidabilissimo, sacra fecisse, ne ipsis
noceret.

Quicumq; igitur in hac tractatione febrium
diligenter, accuratèq; versatus fuerit, is bonam
partem artis non abs re absoluisse existimabitur.

CAPVT I. Quid sit febris.

Febris

FE
corpu
Hipp
tiam
De
In lib
calor n
natiue
est, cu
nem o
Ne
A r e
bere v
corde
niuers
Cu
onibus
officit
intem
ta vni
cim
tur in
seu na
tum
um,
a pri
fit, na
aris.

Lib : Caput I.

1.

Febri vox à feruore profecta est (Græcis πυρετός ἀπὸ τῆς πυρός) quod ex ea corpus afluare, ac prope ignescere, soleat. Hipp non solum vehementissimam, sed etiam mitiorem, πῦρ nominauit.

In Epid.

Definitur à Galeno varijs in locis variè.

In lib. 1 Aph. c. 16. Febris, inquit, est calor natiuus conuersus in igneum, seu, conuersio natiue caliditatis in igneam 8 Meth. c. 1. Febris est, cum adeò immodicè auctus est calor, ut hominem offendat, & actiones ledat.

Definitio febris

Nos more Auicennæ, prima quartæ, tractat. Et 1 c. 1. plenius hac ratione febrem describere volumus: Febris est calor immodicus, in corde accensus, indeq; per venas, & arterias, in vniuersum corpus diffusus, actiones primò ledens.

Febris
quid.

Melus deso

Cum dicimus febrem esse calorem, qui actionibus primò, ac per se, sine alterius interuentu officit, ostendimus febrem esse morbum in intemperie, non in compositione, aut soluta vnitatè. Cum calorè immodicū dicim9, respicim9 ad calorè natiuū. Duplex enim reperitur in corporib9 nostris calor, natiu9 alter, seu naturalis, alter præter naturā. Illū innatum, & secundum naturam, & proprium, & primigenium, vocitant: quod à primordijs nostræ generationis nobis inest, naturæ vernaculus, ac perquàm familiaris. Idem quoq; est bene temperatus, seu

Calor in
corpore
duplex.

M m 2

à con-

Ecceles Baruchii Bruxen.

De febr. in genere

à contrario refractus, & ad mediocritatem quandam, & moderationem reductus actu humidus: quoniam fundatur in subiecto, quod plurimum aeræ & aquæ substantiæ continet; semine nimirum, & sanguine.

Calor innatus duplex.

Innatus. Calor.

Calor hic innatus (de quo hactenus) vnus singulis nostri corporis partibus ab origine insertus, eo gradu, qui naturæ cuiusque particulæ expediat; quem ideo proprie innatum, implantatum, seu emphyton, & cum Auicenna, fixū dicere possumus. Estque tepidus quidam calor, verius potentiā tali, quā actu: eum proinde Gal. aeri in cubiculo aliquo clauso, vel qualis æstatis tempore in domibus sentitur, comparat.

Influens calor.

Alter qui ex corde, vegetior, multoque feruentior, cum sanguine, & spiritu, per arteriarū ductus, influit, priorem illū in partibus veluti sopitum, ac delitescentem, in actum deducit, fouet, confirmat. Quamobrem igni accenso domum calefacienti ab eodem Gal. meritō assimilatur; cuius etiam subiectum, ac focus, ab Aristotēle de part. anim. cap. 7. cor ipsum statuitur.

Influens hic calor ad omnes quidem operationes pernecessarius est; non tamen ab ipso proficiscitur actio, sed oportet hunc cum insito in vnum conuenire, vt ex ambo-

bus

h⁹ coniunctis tertius quidam integretur, ac
 resultet (Scholæ calorem hunc actuatum
 vocant) quo forma corporis, seu, anima
 rationalis, tanquam idoneo vitæ ad functi-
 ones instrumento, vtatur; in quem omnia
 illa caloris natiui epitheta, atq; attributa,
 quæ pæssim apud Medicos obuia sunt, aptis-
 simè dicuntur. Vt quòd Gal & Hippo-
 pæssim calorem innatum, generationis no-
 stræ, omniumq; naturalium operum, aucto-
 rem, eundemq; subinde naturam, faculta-
 tem corpus nostrum gubernantem, animã,
 vel saltem animæ præcipuum instrumentũ,
 indigitant, de hoc calore pronuntiatum
 fuisse debet existimari. Fernelius maiora,
 quàm par est, de dicto calore sibi persua-
 dens, eum, veluti diuinum, cælestem, atq;
 altioris, quàm hæc inferiora, originis, ad-
 miratur, neq; eiusdem generis esse cum ca-
 lore ignis arbitratur. Verùm hæc subabsur-
 da, viri docti aliàs, confutârunt. Hæc de
 calore natuo.

Actuato
 calor ex
 insito, &
 influente
 resultat.

Fernelii
 error cõ-
 futatus.

Alter huic oppositus calor, præter natu-
 ram, externus, vel extraneus, & immodicus,
 appellatur. Hic talis euadit, quando calor
 natiuus, limites suos prætergressus, ad eum
 usq; gradũ exardescit; sub quo anima, tan-
 quàm instrumento, suas operationes nequit

Calor
 præter
 naturam.

De febr. in genere

Calor
præter
naturam
eiusdem
est speciei
cum na-
turali.

inposterum edere. Hinc constat, illū non
alterius esse speciei (veluti quibusdam vi-
sum fuit) sed sola gradus intensione, acris-
monia, vel (vt loquuntur) secundum ma-
ius & minus, à naturali differre: siquidem
illud bene à Galenò fuit proditum, *febrem
esse conuersionem nativæ caliditatis in igneam.*
Nam vbi nativus calor eousq; progressus
est, adurit, colliquat, dissipat humores, &
substantiam corporis. Neq; tamen hac di-
scissione ad naturam igneam calor natura-
lis ita definit esse, quin aliqua ex parte sal-
tem, licet imperfectius, vitæ, & naturæ,
munia obeat.

Calor
non na-
turalis.

Nulli autem dubium, inter hunc arden-
tem, seu igneum, penitusq; præternatura-
lem, & blandum illum, mitissimū, atq; na-
turæ muneribus præstandis accommoda-
tissimum, alium adhuc quendam medium
interuenire, qui naturali quidem maior, atq;
intensior, præternaturali autem remissior,
existat; quem propterea, in confinio vtriusq;
positum, non naturalem dicimus. Ita Gal. ad
scititium, & acrem, mordacem, & non na-
turalem calorem nominat, qui mutatione,
seu decursu ætatis, in corpus inducitur.
Cum enim *siccitas* sit lima caloris, erit vt
insitus calor, ab adolescentia statim vsq; ad
vigo.

Siccitas

vigo
tend
ti rep
vbi a
Quo
bie d
nost
sagu
ctū, c
decre
tius
te pro
um, c
neres
Hipp
qua di
moritu
Cal
cet, a
febris
ximus
nihil
acutic
dient
Nam
Sanati
qua fe
ob cal

Lib: Caput I.

3.

vigoris tempus, semper magis ac magis in-
tendatur, itaq; plus terrei, & ignei elemen-
ti representet, secus ac ab initio natiuitatis,
vbi aerea & aquea natura præualebat.

lima ca-
loris.

Quomocunq; tamen calor increseat, su-
biectum certè illius radicale humidum, ex
nostræ generationis primordiis semine ac
sanguine mēstruo, in solidis partib; dereli-
ctū, cō magis perpetim imminuitur, ad cuius
decrementū, secundum proportionem, na-
tius calor etiam decrescit, quò longius æta-
te procedit: haud paulò aliter atq; elychni-
um, quamuis assiduo fruatur pabulo, in ci-
neres tandem vi flammæ redigitur. Vnde
Hippocrates non immeritò dixit, *hominem
qua die nascitur calidissimum humidissimum, quò
moritur, frigidissimum, siccissimumq; esse.*

Caloris
subiectū
radicale
humidū.

Calorem hunc alterum, immodicum scili-
cet, ac *præternaturalem*, genus in definitione
febris constituimus: quoniam (vt iam di-
ximus) febris est intemperies calida, quæ
nihil aliud dici potest, quàm intensio, seu
acuties caloris, supra modum naturæ expe-
dientem, cui rei fidem facit ipsa sanatio.
Nam Gal. 8. Meth. c. 1. alijsq; in locis, ait:
*Sanatio febris, est refrigeratio; & febris omnis,
qua febris est, refrigerari postulat, tamet si
ob causam illius, vel adiunctum alium affe-*

ctum

De febr. in genere

stum, interdum calorifica adhibeantur. Necessè est igitur, vt febris sit excessus quidam caloris.

Huius deinde in calore excessus, seu febris, focum, primumq; suscitabulum, in corde constituimus. Quoniam ratio persuadet in illa primum parte febrilem ardorem, qui corpus vniuersum accendit, exæstuarè, atq; ebullire, quæ alijs omnibus per naturam etiam calidior, feruentiorq; est, adeoq; calorem vberem, tanquàm fons quidam perennis, in cætera membra diffundit. Adiccim; calorè hunc à corde per *venas, & arterias*, in vniuersum corpus emanare. Tamen si enim à corde, supra mediocritatè naturæ vtilem, incaléscente, per contactum quòq; partes, initio quidem proximæ; inde autem aliæ atq; aliæ successione quadam, incalésce-
re queant, tam subita tamen caloris diffusio per totum corpus, quàm subita in febribus apparet, non potest aliò, quàm in venas, & arterias, referri, tunc temporis feruidiori materiâ imbutas, eumq; calorem quau-
uerum importantes, nisi quid impediât, vt frigg aeris ambientis, aut summus feruor visceris alicuius, sanguinem, & spiritus, cucurbitulæ ritu, ad se trahentis. Cùm enim acciderit, quod Hipp. 4. Aph. 48 prædi-
xit,

Lib. Caput I.

5.

ste, ut interiores partes vrantur, externæ frigeant, cum præsentissimo vitæ periculo id erit; & Gal 1. Pror. tex Com. 7. febrilem ait non solum eum, qui in superficie corporis igneam habet caliditatem, sed & illam, idq; multò magis, qui eam in corde, corporis penetralibus, ac visceribus, retinet. Per accidens igitur est febrili calori non expandi per totum corpus.

Cum partes interiores vrantur, exteriæ frigent. lethale.

Ad hæc, verba in definitione posita, non tam actum, quam aptitudinem denotant.

Tandem etiam postremâ definitionis particulâ, febrilem æstum ab alijs magnis ardoribus hic verbis discriminauimus, quòd hic debeat primò actiones ledere; alioquin calor febrilis ab alijs discerpatur. nim non omnis febris esset morbus, & multi calores, ut ij, qui ab exercitatione, meri potatione, balneo, cursu, lucta, &c. contrahuntur, ad hanc febrium classem perducerentur: quod tamen haudquaquam pertinent, nisi iam eouiq; increuerint, ut actionibus primò, ac per se, incommodent.

CAPVT II.

De febrium diuisione.

N n

Hips

De febr. in genere

Differen-
tie febr.
um.

Hippocrates 6. Epid. lect. 1. tex. 19. & Galenus 1. de diff. febr. c. 1 complures febrium diuisiones assignat. quarum eas, quæ minus euidenter sunt, atque exercitatum Medici actum exigunt, in præsentia prætermittimus.

Omnium communissima, vñ receptissima, & (veluti Galenus quoque visum est) propriissima, à subiecto, seu materia, desumitur, in qua primum febrilis calor conflatur. Cum autem ex definitione febris clarum sit, primam illius seu sedem, seu suum tabulum, esse cor ipsum, cor verò continetur ex tribus hisce, solida substantia, humore, & spiritu, consequens est asserere, febrem necessariò suscitari in cordis vel spiritu, vel humore, vel solida substantia. Primam ephemeram, seu diariam, secundam visitato vocabulo humoralem, & tertiam hecticam dicunt. Necesse est autem tam in humoralibus, quam hecticis aliquod ex hisce tribus calefactum esse, reliqua duo solum calefieri: ut in humoralibus primum calefactos esse humores, incalescere spiritus, & solidam substantiam in hectica contra solidam substantiam esse calefactam, incalescere spiritus, & humores. Plurimum porro inter se dilcrepant (Gal. teste) calefieri, & calefactum esse, quando nimirum illud scilicet, id est, dispositio.

Tria pri-
marum
simplicium
februm
genera.

dispo-
bitu-
telli-
lebe-
tur
bris
lis
no
vbi
sean-
desi-
ne
lidi-
hect-
in
foli-
Eph-
las
saru-
cap-
Hur-
mitt-
tred-
Gal-
ne,
qui
nem
cau-

Lib. Caput II.

6.

dispositionem, hoc verò hexim, id est, habitum, denotat. Ad cuius rei pleniorē intelligentiam plurimūm conducit similitudo lebetis i. de diff. febr. c. j. allata. Probatū igitur est ex iam dictis denominationem febbris ab eo peti, ex quo calor præternaturalis inchoat. Facilis tamen est transitus ab uno genere febris in aliud. Ita ab ephemera, ubi humores ita calefecerint, ut iam putrescant, naturā, & appellatione ephemera desinentibus, resultat humoralis. Pari ratione ex humoralis, & ephemera, si partibus solidis calorem altius impreserint, provenit hæctica. Constitutum igitur sit febres alias in spiritu, alias in humore, alias insuper in solidis partibus excitari.

Ephemera, quæ in spiritu consistunt, nullas habent differentias, nisi ex varietate causarum resultantes; de quibus in peculiari capite seorsim.

Humorales aliæ sunt continuæ, aliæ intermittentes. Continuarum quædam absq. putredine infestant, ut synochus altera, de qua Gal. 9. Meth. c. 2; quædam cum putredine, humore intra maiora vasa putrescente; qui si est sanguis, sit synochus putrida, cuius neminit Gal. eodem lib. cap. 3; si bilis, sit caulos legitimus, seu tertiana; si pituita, cau-

Epheme-
ra,

Humora-
les aliæ
continuæ,
aliæ inter-
mitten-
tes,

De febr. in genere li

sos spurius, seu quotidiana; si attrahantur, v. g.
 quartana. Hæ putridæ sunt, quas Gal. fe-
 bres primarias, seu febres morbos, indigi-
 tat, ad disunctionem febrium, quæ intiam-
 matorios viscerum affectus, phrenitidem,
 anginam, pulmoniam, pleuritidem, &c.
 comitantur; quæq; proinde symptomaticæ
 audiunt, & ad morem aliorum symptoma-
 tum, sublato, vnde pendent, morbo, ipsæ
 quæq; tolluntur.

Febres
 Sympto-
 maticæ
 quæ.

Pestilens
 febris.

De peste, ac pestilente febre, quam pes-
 tridis annumerare solent, seorsim agendum
 existimamus; præsertim cum vulgata curan-
 darum febrium methodo ipsius sanatio non
 comprehendatur.

Humo-
 res bifa-
 riam pu-
 trefcunt.

Intermittentium porro, quæ sunt ab
 humoribus, vel extra vasa, vel saltem extra
 maiora, putrescentibus, alia fit à bile, tertio-
 ana; alia à pituita, quotidiana; alia demum
 à succo sæculento, quartana. Quibus ex
 Hipp. 1. Epid. sect. 3. tex. 2. rectè annu-
 raues quintanas, sextanas, septimanas, &
 hialq; longioris periodi febres. Rursus hu-

Humora-
 lium alia
 diuisio.

moralium. harum febrium, aliquæ sunt ex-
 quisitæ, seu legitimæ, quædam contra spu-
 ria: Exquisitæ appellantur, quæ ex humo-
 re illo, cui originem suam debent, solo, im-
 permixtoq; nascuntur: vt tertiana V. G.

exqui-

Lib. Caput II.

7.

exquisita illa est, quam vera bilis peperit. Spuria, cum plures vno humore sibi inuicem permiscantur: vt, si in tertiana, bili accedit pituita, vel melancholia. Id ipsum de alijs quoq; febribus sentire licet.

Hectica tandem, quæ in solida cordis substantia firmatur, nequaquã in alias species diuiditur, sed tantum certis quibusdam gradibus, vel morbi temporibus potius, distinguitur; cum alia sit inchoata, alia incretens, alia deniq; confirmata. Postremo febres omnes sunt, vel simplices, seuque generis: vt ephimera, sola putrida, hectica sola: & ex putridis, vel sola continua, vel sola intermittens, &c. Vel inter se confusæ, atq; compositz cernuntur: vt, hectica cum putrida: inter putridas continua cum intermittente, quemadmodum in hemitritæo vluenit: vel intermittentes sibi inuicem copulantur, partim eiusdem speciei, hinc tertiana duplex, quartana duplex triplex, &c. partim diuersarum specierum, vnde tertiana cum quotidiana, aut hæc cum quartana non raro iungitur. Subinde afficitur aliquo: vt, inflammationi hepatis connectuntur, dicunturq; typhodes, aut cum insigni, & ad se curam reuocante, symptomate, vt est febris syncopalis.

Hectica
febris.

Secunda
februm
diuisio.

N n 3

Alia

De febr. in genere

Alia febrium diuifio coincideit cum ea, qua reliquos etiam morbos, & res quascunq; genitas, diftribuimus penes tempora fide ætates fuas, in principium, augmentum, flatum, & (nifi lethalis fuerit febris) declinationem; quæ deceflio nominatur à Cor. Celſo. Hæc rursus tempora vel ſunt vniuerſalia, vel particularia. Vniuerſalia dicuntur, quæ totius morbi ideam, & eam, quam Hipp. j Aph 12. Gal 1. de crif. c. 4. caſtataſin, id eſt, conſtitutionem nominat, complectuntur. Sub hac acceptione vniuerſale principium durat (de humoralibus agendo) quamdiu ſigna concoctionis nondum apparent Augmentum, cùm inualeſcente calore, concoctionis quædam veſtigia conſpiciuntur, ſi quidem morbus ad ſalutem tendat, & cùm ſymptomata inualeſcunt. Status quando materia maxime coquitur, febris cum ſuis accidentibus vehementiſſima eſt, quæ aliquandiu neq; maniſeſte augeri, neq; diminui, deprehenditur. Declinatio, cùm & febrilis ardor remittit, materia concocta eſt, ſymptomata mitteſcunt, & æger leuius habet. Hæc vel omnia, vel aliqua tempora, quædam febres celeriter, quædam tam diùs percurrunt, & abſoluunt.

Vniuerſa
de temp
quid.

Principiū
quid.
Augmen
tum quid

Status
quid.

Declina
tio quid.

Parti.

Lib. Caput II.

8.

Particularia solum in ijs febribus loci Tempus habent, quæ per circuitus, seu, periodos, particula reuertuntur, quales sunt tam continuæ, re inquis. quam intermittentes omnes, præter synochos locum habeat.

Periodum, seu circuitum, cum Galeno lib. de morb temp. c. 6 nominamus totum illud spatium, quod inter vnâ morbi accessione, & alterâ, intercedit, ac in quotidiana circumscriptur horis 24. in tertiana 48 in quartana 72

periodus
quid.

Periodus diuiditur in paroxysmum, & remissionem Paroxysmus, (eodem auctore 1, Aph Com 12) est deterior totius periodi tempus, principium, augmentum, & vigorem, seu statum, complectens Remissio declinationem morbi continet, & in intermittentibus apyrexiam, infebrecitationem, integritatem Celso, seu tempus, quod a febre immune inter duos paroxysmos mediâ intercedit: alij interuallum, & quietem, dicere conlueuerunt.

Diuisio
circuitus
Paroxysmus
quid

Remissio
quid

Continuis febribus quinque assignantur tempora: Principium, inæqualitas, augmentum, status, & declinatio. Intermittentibus hæc eadem, & præterea interuallum, seu infebrecitatio

Tempora
febris
continuarum,
intermittentium.

Tempora particularia deprehenduntur ex

De febr. in genere

Principi tur ex motu caloris, & progressionem sympto-
umquan matum Principium igitur adesse iudica-
do adess mus, cum calor ab extremis partibus retrahitur, ad thoracem conluit, atq; ipsa febrificae materies, ritu viridium lignorum, quae flammam nondum edunt, accenditur.

In qua Inaequalitas, quum ad eundem calor est ma-
litas qua teria, quam penitus obtruebatur, emergere incipit, atq; eluctari, nondum tamen neq; intro, neq; foras manifeste inclinatur.

Augmen Augmentum quando iam manifestus calor a d extremis reuertitur, ac morbo-
tum sam saburram, quanta praesentem paroxysmum concitauerat, superat, symptomata etiam omnia inualescunt, & exasperantur.

Status Status, vigorq; cognoscitur, quando
seu vi ad summam ebullitionem materia accensio
gor. peruenit, calor vniuersum corpus ex aequo habet, omniaq; accidentia sunt vehemensissima.

Declina Declinatio, cum calor pedes occupauit, deserto pectore, nocens materia diffilatur, ac ventilatur; symptomata etiam mitigantur, seu decreuescunt. Hanc in intermittentibus quies, aut apyrexia, excipit.

CAPVT III.

De causa

Libr. Caput III.

De causis febrium in genere.

Cum febrem dixerimus esse calorem immodicum, quæcunque eiusmodi calorem in nobis accendere, atque excitare nata sunt, ea febrium causæ effectrices in vniuersum appellari merentur.

Horum quædam hic præstant cum motu, alia sine motu. Si cum motu, is erit vel corporis, vel animi. Corporis, ut equitatio, lucta, multum etiam, ac validum quodcunque tandem exercitium, lassitudo corporis, &c. Animi, cum spiritus, & sanguis a perturbationibus varijs variè agitantur, potissimum ira, timore, tristitia, &c.

Sine motu calefaciunt quædam per se, quædam ex accidenti tantum.

Eorumquæ per se illud efficiunt, alia actu, potestate alia calorem pariunt.

Actu rursus nonnulla intrinsecus, non nulla extrinsecus, inflammant. Intrinsecus, ubi V. G. putrilago aliqua latet in corpore, humoris, vermium, puris, ex abscessu, aut membri cuiuspiam in phæcelo correpti. Inde enim putrescens vapor cordi adspiratur, & pro varietate materia, foeci; putredinis, hæc febres

Calor febrilis accenditur cum aut sine motu.

Sine motu per se, & per accidens. Per se actu & potentia. Actu extrinsecus & intrinsecus.

De febr. in genere

febres exsurgunt. Extrinsecus, sol, ignis, calidius balneum, medicamenta, ceteraq; foris incidentia, quæ impensius calefacere queunt.

Potestate
quæ cale-
faciunt.

Potestate calefaciunt, quæ, vt effectum hunc edant, indigent calore nostro, quo manum porrigente agere queant. Huius ordinis sunt medicamenta, & alimenta salia, acrida, amara, &c.

Per acci-
dens ca-
lefacien-
tia.

Ex accidenti calefacere creduntur, quæ per antiperistalsim calorem colligunt, & ad interiora compellunt. Adhæc, quæ prohibent transpirationem, eundem con- duplicant, atq; accendunt, qualia sunt refrigeratio, cutis cõstipatio, partim à frigore, partim alijs rebus adstringentibus, vt balneo aquæ aluminosæ. Item leuior obstructio porrorum cutis. Nam his de causis natiui caloris ventilatio præpeditur, idemq; à fumosis exhalationibus in corpore cõcreitis, & intermissis, supramodum excreseit, haud aliter ac hypocausta, quæ nullos concepti caloris habent exitus, magis ac magis aestuare solent.

Ad febres
excitan-
das requi-
sita.

Et quamuis hæc ita habeant, tamen, vt ex hisce causis febris accendatur, necesse insuper est eas, & esse vehementes, & aliquandiu agere, corpusq; contingere; atq; hoc

Lib. Caput IIII.

10.

hoc ipsum velut subiectu calori eiusmodi suscipiendo apparatus esse.

Sed neq; hec ipsa sola febrem accendere queunt, nisi accedat motus validus, & unio caloris natui in corde, & foco febris, ab impetu quodam naturæ proficiscens, quæ seipsa nullo magistro docta, magnis corporis incommodis siue per concoctionem, siue per expulsionem, non raro subuenit, quemadmodum luculenter docuimus Thomas à Vega lib. de diff. febr. magnis argumentorum momentis euincit.

Aliare-
quilita.

CAPVT IV.

De signis febrium communibus.

GAL. libello de marcore cap. 5. recte docet, calorem immodicum, seu febrilem, ex tribus, tactu nempe, respiratio-
ne, ac pulsu, certissimo cognosci.

Commu-
nia febris
signa.

Tactus certè si non in vniuerso corporis ambitu, in thorace tamen, & hypochondrijs æstuantem illam caliditatem manifestè prodit.

Sic respiratio quoq; maior erit, frequentior, & velocior, quam secundum naturam esse

1.

2.

De febr. in genere

esse deberet; nisi fortè affectus aliquis alius feбри coniunctus, istud impediatur, ut pleuritis V. G. phlegmone diaphragmatis.

Adhæc, spiritus ab ore efflatus feruentior multò percipietur.

Pulsus respirationi, quoad magnitudinem, celeritatem, frequentiam, proportionem quadam respondebit. Et licet hæc ita sint constituta; non tamen in quavis febre ista conuenire est necessarium. Satis enim est in quavis febre vel vnum, vel duo, vel omnia caloris exuperantiam detegere.

Febribus
qui magis ob-
noxii.

Inter corpora in febres quælibet sunt procliuiora calida, quam frigida Gal. asserente 7. Meth. cap. 8. In putridas verò, quæ omnium sunt frequentissimæ, facilius incidunt ij, quibus cor, aut hepar, iusto calidius, & humidius est, quemadmodum constat ex cap. 38 & 47. artis medicæ.

Prognosis febrium

Ad anni tempora quod attinet, Ver & Aestas febrium sunt feracissima; De sexumares sceminis; Ex ætatibus adolescentes, & iuuenes, frequentius febriunt.

Febres

quædoque: ræ breues, an longæ, salutares, an exitiosæ, salutares. Hipp. in 4. prælagiorum libello de crilib. 4. Aph. multa. Nos singillatim in tractatione singularum specierum suo loco adnotabimus. Istud

Illud animaduersione perquam dignum est, febres quandoque adeo non obesse, ut morbis quibusdam percurandis egregiam præstent operam, velut apoplexia, 6. Aph. 5. paralyti, stupori, conuulsioni, 5. Aph. 70. catarrho; nam febre succedente concoquitur, dolori hepatis, & colico ex statu 6. Aph. 40. & 44. Alijsq; huius generis à frigida vel intemperie, vel materia, vel vitio, pendentibus.

De per-
dita ob-
crapu-
lam lo-
quel a &
Aph: 10.

CAPUT V.

De curatione febrium in genere.

GALENI lib. 10. Meth. cap. 9. febrium omnium, quæ febres sunt, propriū, vnicuiq; remedium statuit refrigerationem, siue per se, siue per accidens, actu, vel potestate, agat, Hippocrates 1. Aph. 16. humectationem in febribus necessariam statuit.

Febrio
curation
est refri-
geratio
humecta-
tio.

Nos vtrumq; præsidiorum genus hoc facere arbitramur. Cum enim febris omnia in caloris quadam efferuescentia, seu intensione, consistat, calor autem is naturam minus recipiat, adeoq; corpora siccet, nemo sanè dubitabit, vtriq; excessui, caloris nempe, ac siccitatis, contrarium frigidum humidum.

De febr. in genere

Quousq;
refrige-
randum,
& hume-
standum

midum opponendum esse auxilium.

Quousq; verò refrigerando, humectando, liceat progredi, ex magnitudine febris discere oportebit, quam rursus e naturali temperie, suis notis designatâ, metiemur. Tanta enim est febris, quanta corporis agrotantis de pristina temperatura ad intemperiem hanc morbosam. siue febrilem, facta discessio est. Tandiu itaq; in usurpatione prædictorum præsidiorum persistendum erit, donec corpus pristinae naturæ, seu temperamento suo, fuerit restitutum.

At se-
quendus
in curan-
do febr-
ibus.

Cum igitur æt ambiens de eorum sit numero, quæ minimè declinari, aut deitari, queunt, ubi is debito feruentior erit, quia tum subit rationem causæ febrim fouentis, refrigerandum est impensius: contra ubi frigidior est, quoniam remedij vices explet, de refrigerantium more, atq; efficacia, demendum significat. Quod autem reliquus victus humidus febricitantibus omnibus conferat, ex citato, 16. sect. 1. Aph. iam liquet.

Quando
cibandi
febrici-
antes,

Sed & illud ex j. Aph. 11. notum est de tempore cibandi, in accessionibus februm, quæ per circuitus reuertuntur, nihil cibi, potusue, permittendum ante perfectam paroxysmi declinationem; nisi fortè æger os

venti-

Lib. Caput V.

181

ventriculi bile suffusum habeat, quem picrocholon nominant, tum enim opportunè vel in ipso paroxysmi vigore (Gal. affir. mante ro. Meth. cap. 4. reficitur.

Antiquitus aquæ dulcis balneo in omni febris genere utebantur, præterquam in quales, & putridis, in quibus non nisi concocta materia peccante id adhibebant. Verùm in nostra regione, propter mutatam fortè viuendi rationem, & corporum plenitudinem, aquæ balneum, etiam in declinatione harum febrium, periculo recidij non omnino carere experientia sæpenumerò demonstrauit.

Postremo loco inter externa præsidia etiam periculis quædam, & amuleta febrium, à veteribus celebrantur: ut, succinum collo alligatum, ex Plinio; Saphyrus, & Chrysosolitus in manibus gestatus; & si quæ sunt huius farinae alia, quorum fidem penes auctores suos relinquendam cenlemus. Hactenus de febribus in genere, seu communi, egimus.

Externæ
præsidia
febris.

De febribus in specie.

CA.

De febre ephemera.

CAPVT VI.

De febre ephemera.

Febbris ephemera, siue diaria, (sic dicta, quod dies spatium non excedat, 4. Aph. Com. ss. apud Gal.) est calor immodicus in spiritibus accensus.

Eadem tamen febris tamen in plures quandoq; dies producat, vel propter errorem in curatione commissum, vel densitatem, & occlusionem meatuum cutis, vaporum istum calorem arctius, atq; diutius, cohibentem, siue alias ob causam efficientis stabilitatem, nomen diariæ non amittit.

Causa.

A quibus
causis
proveni-
at eph-
emera.

Prouenit autem ephemera omnis fere a causis procatarepticis, seu manifestis, decepta illa, quam inflammatio adenum, seu bubo, excitauit, quæq; ex obstructione porrorum cutis, aut vehementi aliquo conatu, & vnione spirituum, atq; caloris, ad expulsionem nocentis alicuius materię, vt in diarrhæa, & similibus excretionibus, insurgentis dependet.

Causa

Causæ externæ potissimæ sunt: in solatio;

Lib. Caput vi.

13.

latio, perfrigeratio, defatigatio, cutis densa, externa
tio, magnus dolor, animi pathemata, ira, epheme-
tristitia, curæ, timor, &c. peruigilium, inc-
dia, diuturnior sitis tolerantia, ebrietas fre-
quentior, &c.

Signa.

HAs causas distinguere, & à se inuicem,
tacente etiam ægro, discriminare, plu-
ribus docet Galenus 8. Meth. c. ult. de rat.
cur. ad Glauc. c. 2. 2. etiam de cris. cap. ult.
In vniuersum loquendo, facilius curatur
hæc febris, quam cognoscitur. Nihilomi-
nus tamen eiusmodi ferè notis deprehen-
di potest. Aliqua commemoratarum cau-
sarum febri præcessit; vna statim primo
die apparet naturalis simillima, & conco-
cta; Galenus tamen ait 2. de cris. c. ult. om-
nibus communiter esse rufiores.

Signa di-
aræ.

Pulsus est celer, & frequēs, nonūquam ma-
gnus; exquisitè autē seruat naturalem æquali-
tatem, mollitiē, & ordinem 2. de cris. citato.

Pulsus.

Calor occurrit tactui minimè mor-
dax, sed qualis ab exercitio, aut vini mera-
cionis potatione, comparatur, isq; æqualiter
in totum corpus, febre increfcente, expansus.

Calor.

Non adsunt graua illa, & molesta alia-
rum febrium symptomata, ingens cepha-
lalgia,

Sympto-
mata ad-

P p

lalgia,

De febre ephamera.

iuncta. Ialga, inexplata fitis; inquietudo &c. nisi febris ob dolorem sit genita.

Desinit cum sudore, madore, vel halituoso quodam transpiratu, vnaq; accidentia, quæ prius aderant, vt levis dolor capitis &c. tolluntur.

A iuuantibus, & lædentibus petatum ephemeræ signum proponit, si æger, balneum ingressus, non inhorrescat. Nam vbi secus accidit, putridam subesse significatur.

PROGNOSIS.

Quod spectat ad prognosticum, hæc febris ex se omni vacat periculo, facile tamen in alia febrium genera permutatur; quam permutationem minatur dolor capitis ultra 16. vel 20. horas protractus, præsertim vbi æstus febrilis post tertium diem constanter durat.

CURATIO.

Curatio in eo consistit, vt causæ effectrices, etiamsi non adsint, in contrarium permittentur. Ita vt opponamus vigiliæ somnum, lassitudini quietem, obstructioni apertionem, tristitiæ letitiā, curis animi relaxationem.

Post opera dāda, vt immodicus calor spirituum resingatur.

Quibus intentionibus omnibus ferè ephemeris communia sint hæc præsidia:

balnea

Liber Caput vi.

14.

balneum,unctio,frictio,cibus euehymus,& facilis
concoctu,minimeq;obstruens:vinum album,
tenue,aquosum;si tamē certo adhibito disci-
mine,vt dicemus,vsurpetur.

Cura fe-
bris oria
ex insola
tione.

Ephemeræ igitur ex insolatione expe-
dit lauacrum aquæ dulcis, & irrigatio, seu em-
brocha, syncipitis, ex calida, oleo rosaceo, om-
phacino salis experte, oleo violaceo, facta.

Si ex perfrigeratione oriatur, conue-
nit laconicum, seu aer balnei, & balneum ip-
sum aliquantò calidius: embrocha item ex oleis
temperatè calefacientibus, vt est chamomelinum
irinum, kiliaceum. &c. Vbi autem huic fe-
bri catarrhus, aut grauedo iungitur, & ab ir-
rigationibus, & à lauacro abstinendum e-
rit, dum morbus declinabit.

Experfrigi-
ratio-
ne.

Cui desitas cutis occasione præbuit, ritè
curabitur, si eger diutius in vaporario maneat,
inde descēdat in labrū, & cōfricari se curet o-
leis rarefacientibus, chamæmelino, anethino, &c.

Ex densi-
tate eu-
tis.

Cum fatigatio seu lassitudo peperit
diariam, balneum, mollior frictio cum oleo dul-
ci, ac multo, frequens item corporis refectio ali-
mentis boni succi obita, ita tamen, vt euitetur
cruditas, ex usu sunt.

Ex fatiga-
tione.

Ex peruigilio & immoderatis animi
pathematis pendēti, prodest balneum, & dicta
iam designata; quæ ad humiditatem insuper in-
clinēt;

Ex perui-
gilio, &
animi pa-

De febre ephemerā

elinet; & nisi capitis dolor, venarumq; in temporibus pulsatio id prohibeat vini quoq; potus, præsertim ijs, qui plurimas noctes insomnes transigere, quibus speciatim quoq; applicari debent *somnifera remedia*. Hinc

Ex ira vinum obest.

excipe, quos ira etiam perseverans in febrem coniecit. Nam eiusmodi hominibus vinum obest, priusquam animi perturbatio conquieuit.

Ex inedia.

Et quam inedia peperit, humectate alimonia mox oblata tollitur; præsertim si corpora biliosiora sunt, & sicciora, ut est *cremor ptisanæ, lactuca, portulaca, pisces saxatiles, molli carne præditi, iuscula pullorum, &c.* Huc facit & *balneum*, in quo diutius desidetur, & *frictio cum oleo largo molli manu facta*.

Ex siti.

Ex siti *temperatum dulcis aquæ balneum, ac vinum bene lymphatum*.

Ex crapula.

Ex crapula *vomitibus, ubi ventriculus etiam cibo nunc turget, alioquin clyster iniciendus, aut glans subdita, nisi alius sponte fluat. Ad hæc, lauacrum aquæ, somnus, & quies, benefaciunt.*

Ex bubone.

Ex bubone, *declinante paroxysmo, iuvant, balneum, victus tenuis, & vini abstinencia, dum inflammatio desierit.*

Ex obstructione.

Ad eam postremo, quam obstructio parit, *ephemeram soluendam, remedia, quæ in syncho.*

synocho non putrida proponetur, cōducit.

C A P V T VII.

De febribus sanguineis, vel
Synochis.

Febribus diariis, seu, quæ ab inflammatis spiritibus pendent, absolutis, succedit humoralium appellatarum tractatio. De quarum numero primo loco se offert Synochos, (cuius Gal. meminit, Meth. cap. 2.) seu continens sic dicta, quod vnam habeat accessionem ab initio ad finem vsq; perpetuam manentem, eamq; in plures dies ex-
porrectam.

Hæc febris dicitur calor immodicus in massa sanguinis conceptus, qui calor quandoque cum putredine, aliquando absque hac, infestat.

Vnde duplex confurgit Synochos, vna putrida, imputris altera. Quamvis hæc tamen si finitima est ephemeris, earumq; generi non incommodè accenseri potest, videtur tamen inter merè ephemeris, & putridas, mediam quandam sortiri naturam.

Causa.

Causa Synochion proxima est vapor, vel fumus plurimus a feruidis in corpore proxima

De febribus sanguineis

Synochi. succis sublatus ; qui postmodum non satis foras expirat, sed cohibitus, atq; in venas, & arterias quodammodo reflexus, ardorem quendam præternaturalem sanguini impertitur.

**Causa
antece-
dens in-
terna.**

Causa antecedens (Gal. auctore loco citato) est constipatio insensibilium cutis meatuum, seu pororum, vel carnium etiam subiectarum.

**Causa
externa.**

Hæc constipatio quandoq; dependet à causa externa, vt frigore ambiente, natatione in aquis aluminosis, limosis, argilosis, aut vitriolo imbutis, vel à sole feruente, aliisq; cutim impensius siccare valentibus.

**Interna
causa alia**

Quandoq; etiam interna causa huic præbet occasionem, si pori videlicet à fucis, aut multis, aut crasis, aut lentis obstruantur.

**Locus
putrescē-
tis san-
guinis sy-
nocho.**

Omnes hæc in vniuersum causæ, vbi leuiiores fuerint, synochum imputrem, ingrauescentes verò putridam, proferunt. In quaquidem putredine sanguis non totus corruptescit, vel contaminatur, sed ille potissimum, qui in vasis maioribus, inter alas, & inguina excurrentibus, continetur.

**Tres dif-
ferentiæ
synochi.**

Iam Synochon differentiarum (quemadmodum videre est apud Gal. 9. Meth. c. 3.) tres omnino computantur. Nam quædam carua.

earundem seruant magnitudinem ab initio ad declinationē vsq, quas ob id ὁμοτovsky Græci nominant, quasi semper eundem tenorem retinentes, quædam ad statum vsque iugiter crescunt ἐπακμασικοι, id est, inualescentes, nominatæ; aliæ deniq, paulatim semper minuuntur, decrescuntq, idēο παρακμασικοι, id est, decrescientes vocantur. Huius tantæ varietatis causa (veluti ab eod. Gal. loco citato clarè decetur) dependet ex quantitate vaporis, siue putridi, siue imputris, qui à calore febrili excitatur, & subinde resoluitur. Nam si post prolatam febrem tantū vaporis istius dissipatur, quantum attollitur, fit ὁμοτovsky si minus, ἐπακμασικος, si plus παρακμασικος.

Signa Synochi imputris sunt: calor ingens, utpote ex plurimo vapore occursante manui, qualitate tamen non mordax, sed cuiusmodi est corporis à balneo exeuntis; vrinæ crassitudine, consistentiâ, colore, contentis, à naturali habitu non discedunt longius, pulsus æquales, celeres, maximi, frequentes, vehementes.

Putridam produnt: calor tangenti a. Signa putrior, vrina putredinis indicia præferens, tridæ Synochi, id est, ad colorem roseum accedens, absq, hypostasi laudabili. Tralianus turbidam, & rubram

De febribus sanguineis

& rubram eam indigitat : inæqualitas in pulsu putridis febribus propria, respiratio difficilior. His addunt nonnulli exacerbationem de tertio in tertium ; verum hoc signum est potius alterius febris coniunctæ, aut synochi degenerantis à sua natura.

Communia vtri-
que signa.

Communia vtriusque indicia tam impu-
tridis, quam putribus synochis, corporis v-
niuersi inprimis oculorum, & faciei, vehe-
mens rubor, ac lassitudo, præcesserunt, quæ
plethoram accumulare potuerunt, & ad-
iungunt, quæ eandem præsentem testan-
tur. Nam in frigida ætate, & corporis ha-
bitu frigido, vel gracili, vel raro, vel pauci
sanguinis, synochos excitari minimè con-
tingit, exquisitas videlicet. Quoniam fe-
bres variolarum, & morbillorum eruptio-
nem comitantes, non desunt, qui ad syno-
chos referendas censeant. Adhæc omni-
bus quasi hominibus accidunt. clarum igitur
est non peræquè eas in omnibus esse
synochos exquisitas, sed tantummodò in cor-
poribus carnis, quadratis, & sanguineis.

Morbilli
& vario-
la omni-
bus con-
tingunt.

Prognosis.

Prognosis.

Synochi de genere acutorum morborum
habentur, & quarto, nisi quid peccetur,
vel circiter septimum diem, terminantur.

Ex

Ex imputri quæ multò securior est, in putridam facilis est conuersio; & rursus in vtroq; genere minus periculi adfert, quæ perpetuò decrescit, quàm quæ vel increseit, vel in eodem statu perseverat.

Curatio.

Scopi curationis synochi (iidem autem ferè sunt vtriusq; nisi quòd putrida validioribus eget auxiliis) in eo consistunt, ut cutis, corpusq; adeò vniuersum reddatur transpirabile, quæ densata sunt relaxando, quæ obstructa reserando. Item ut feruor sanguinis obundatur, & præternaturalis calor deferueat.

Curatio
cōtinens
febris.

His intentionibus commodissimè satisfiet duplici præsidiorum genere, sanguinis nempe missione, (nam corpus ponimus esse plethoricum, deinde causa synochi cæberrima est obstructio à sanguinis exuberantia, atq; vt à constipatione pororum cutis nata sit synochus, tamen relaxantia medicamenta locum non habent, nisi progressa missione sanguinis, quia etiam omnia calcfaciunt, & febrim augent, 9. Meth. c. 5.) & aquæ frigide potu liberaliore.

Aphleb:
auspican-
da cura
synochicæ.

Relaxan-
tia ante
phleb: nō
vsurpan-
da.

Sanguinem mitti volunt veteres vsq; ad animi deliquium, quòd inde totum corpus in contrarium statum agatur celerrimè.

Quous-
que lice-
at iuxta

De febribus sanguineis

veterum
sententi-
am nū-
tere san-
gu.

ex lipothymia scilicet refrigerata.

Mittendus igitur sanguis est, nisi pro-
hibeant vires, & ætas, aut natura alio sibi
vacuationis genere salutem quærere vide-
atur; aut cibus in ventriculo etiamnum in-
sit crudus, qui promde prius vel euomen-
dus, vel concoquendus est, aut alius sit con-
stipator, quam quidem glande subacta, vel
infecto enemate, antea subducere, atq; emol-
lire, addebet.

Medica-
menta
pharma-
ceutica.

Id ipsum præstabit lenē aliquod me-
dicamentum, ac refrigerans, vt

Syrupi rosarum solutui vnc. iij. vel iij. vel
Violati solutui vnc. ij. vel

Bolus cassia solus, vel permixta etiā vnc. s.
pulpe tamarindorum.

Pauperioribus sufficiunt

Pauperi-
bus me-
dicamen-
tum

Eleuarij Diaprunis lentissimi drach. 10.

Erumpē-

Si omittatur phlebotomia Gal. citatus 9.
Meth. cap. 4. caloris natui suffocationem,
aut syncopen, impendere tradidit; nisi fortē

te hemor-

rhagia vel

ludore

largo os

mittatur

phleb.

phleb.

phleb.

phleb.

phleb.

phleb.

phleb.

phleb.

phleb.

phleb.

phleb.

robore virium spontanea hemorrhagia, vel
large dimanantibus sudoribus à tanta per-
niciē seruetur ager. Quodcirca primo
quoq; tempore venam incidere oportet; sic
enim natura, parte oneris leuata, ideoq; con-
firmata, validius reliquam morbi materiam
propellit. Vnde post phlebotomiam ne-
cessario

cessa-
etiam
sudor
synoc
cto p

flent
tur a
tuitu
casu

nem
inter
um e
ribus
bent
accu
tiri.

ram
(ex
dubi
tem
diap
tame
quæ
sang
tate

cessario sequi solet alui deiection, interdum etiam bilis vomitus, quas res postea excipit sudor, vel mador totius corporis. Quinetia synochus putrida (eodem auctore) hoc pacto præuenitur.

De tempore nil vetat, modo vires consentiant, quodcumq; venam aperire. Cæditur autem opportunè Hepatica, nisi ubi metuitur apoplexia sanguinea, vel angina; quo casu Communem, seu Mediam, præferunt.

Tutius verò est sanguinis detractio nem partiri, ut inter vtramq; horæ V. G. 8. intercedant, quam semel ad animi deliquium cum profundere; nisi quis in artis operibus diu multumq; versatus, vires decumbentis exactè sibi perspectas habeat, easq; accuratori quadam ratione nouerit dimettiri.

In pueris vicariam phlebotomiæ operam præstant cucurbitule scarificate. Sunt qui (ex Gal. lib. 4. de san. tuen. cap. 10.) non dubitant phlebotomiæ ob metum, aut ætatem prætermittæ pharmaca diuretica, aut diaphoretica, oportere substituere. Quæ tamen curandi ratio non iniuria suspecta queat esse. Nam purgantia non educunt sanguinem, qui solus in præsentia, & quantitate potissimum peccat: & Gal. per sanita.

Quo tempore, & quæ vena secanda in synoch.

Tutius est partiri sang: quam ad lipothymiam mittere.

Omissa phleb: vtrum diureticis, & diaphoreticis secundum aliud videndum.

Qq a

tem

De febribus sanguineis

tem nullo urgente periculo phlebotomiæ purgationem succedere patitur, minimè verò in morbo tam graui atq; præcipiti. Verinas verò cientes, quæ validiora sunt (nam leuia nil hîc effatu dignum præstant) calida cum sint, febrim augent; eademq; (quod de sudorificis quoq; intelligendum fuerit) in tanta corporis plenitudine, & acumine morbi, minimè conueniunt. Quæ tamen in progressu morbi, exhausta iam non nihil plethora; & si putrida est synochus, materia quadamtenus concocta, atq; domita, vsurpare nihil prohibet.

Ob imbecillitatē
virium omissa
phleb: frigida
largiori haustu
propinatur.
Quæ ardeant à
potu frigide.
In imputri
quo

Galenus, si ob ægri pusillanimitatem prætermissa fuerit phlebotomia, frigidam largiori haustu eius loco indulget; confidentiùs verò ijs propinat, qui etiamnum sani frigidæ potationi assueuere.

Excipiuntur alioqui à tali poculo, quib; aliquod viscus frigidus, atq; imbecillus, utpote ventriculus, iecur, pulmo, vel tumore quopiam pæternaturâ laborat, ut inflammatione, & demate, scirrho, &c. vel si aliàs morbus ex multis lentis, & crassis, succis constat, aut cum putredine consistit, neq; signa concoctionis adhuc in vrinis ostendit. Vnde fit, ut synochus imputri quouis tempore & dum febris admodum feruet, & æstuat; putridæ autem non

non antequam coctionis alicuius in lotio-
notæ appareant, potus hic frigida sit per-
mittendus. Dixi coctionis alicuius; integrā
enim semper præstolari non licet, quia pe-
riculum est quandoq; ne corpus interest
sub tanto æstu, emarcescat, & in hecticam
insanabilem præcipitetur.

Post haustam frigidam multis fragulis
æger continuò inuolui, & operiri debet, vt
dein, quot vsuvenire solet, vomitus, vel su-
dor copiosus, vel alia deiection, succedat.

Quantum porro frigida propinari li-
cet, docet Hipp. in Epid. qui duarum he-
minarum, seu cotilarum, id est, vnc. xviii.
eam permittit; Gal. ad saturitatem vsq; se
ingurgitare finit.

Si quid antè dictorum aquæ poculum
inhibeat, ad alia transire possumus, quæ mi-
nore periculo ardorem restringere valent:
Vt sunt, *Aqua hordei saccharati.* vel
*Aqua stillatitia endiuiæ, cichorei, acetosæ, fraga-
rum.* &c. syrupo de limonibus, de endiuiæ, de ace-
tosæ, vel iulebis, rosaceo, violaceo, permixtæ.

Vbi crassus, & viscosus, fuerit san-
guis, à veteribus commendatissimum est o-
xymel. Nobis Syrupus acetosus simplex, & ox-
sacchara, in vsu sunt.

Si pororum cutis conspiciatur febrim

Qq 3

peperit,

uis tem-
pore fri-
gida dā-
da.

In pueri-
da appa-
rentibus
coctionis
signis fri-
gida pro-
pinanda.

Haustra
frigida
quid æ-
gro faci-
endum.
Quantum
frigida
propinan-
dum.

Si frigida
improbe-
tur quali
asint d
lubenda.
A crasso
sanguine
ferme ge-
nita po-
tus

A con-

De febribus sanguineis.

Ripatione peperit, illam, præmissa humoris morboſi
curatio vacuatione, rarefacere, atq; relaxare oportet
frictio frictione molli cum linteis calentibus,
ieiuno ieiuno ventre, obita inunctione cum oleo cham
memelino memelino, anethino, &c. sudorificis mitioribus,
de quibus alias.

Victus ratio
quod quod
esse de
beat

Victus ratio vniuerſa ad frigidum de
clinat cum modica ſiccitate. Videntur carnes,
vinum, oua, dulcia omnia; aſi varium im
becillitas aliud ſuaſerit.

Quantum in
imputri
& putri
da cibanda
agri

In imputrida Synocho parcissi-
mè cibandi sunt ægri, paulò liberalius in putri
da. Quapropter conuenièter datur pri-
ſana hordeacea, aceto roſaceo, vel ſucco quopiam
acido, citri, limonum, aurantium, &c. condita.

Panis è frigida lotus, atq; ſimiliter apparatus.
Lactuca prius elixa, & vt mos fert, cum aceto
(roſaceum melius eſt) & oleo cantillo concinna-
tur.

Ius puli alteratum incocta oxalide, ſimilibus
que refrigerantibus.

Quo tem
pore ci-
bis in-
mendus.

Hora ſumendi cibi eſt, cum æger le-
uius habet; aut vbi hoc tempus expectare
non poſſumus, quæ per ſanitatē fuerant
conſuera.

Potus in
imputri
qualis
in patri

Potus in imputri eſto, aqua ſotana cru-
da, vel leuiter cocta, aut hordeata.

In putrida verò expedit præbere po-
ſſe.

scam, adiecto pauillo sacchari; aliis plas-
cet oxymel, aut decoctum lentium.

In declinatione morbi, & virium des-
bilitate, vinum quoq; tenue, ac dilutum,
permitti queat.

CAPUT VIII.

De febribus biliosis; ac pri- mum de Cauſo, seu ar- dente.

Per febres biliosas, tam continuam, Febri-
quàm intermittentem tertianam, & causi ge-
causam, seu ardentem appellatam, intelli- neralis ac
gimus. De cauſo primo loco agemus, pro- cephalo
pter cognationem, & similitudinem, quam
cum synochis obtinet, & quoniam eius cu-
ratio postmodum etiam aliis biliosis febris
bus accommodari potest.

Hoc nomen *Causos* æquiuocum, & Nomen
pluribus febribus, diuersæ etiam naturæ, & causos æ-
ptatur: nam, latè loquendo, tribuitur om- quiuo-
nibus, quæ magnum ardorem, atq; incen- tum.
dium, asserre consueuerunt, vt synochis, &
tertiāis, tum intermittentibus exquisitis,
tum continuis: propriè verò, ac pressius,
significat febrem acutissimam, & quæ ex-
terat

De febribus biliosis.

Causos scribere possumus, quod sit calor immodicus, ex humore bilioso, in venis, prope cor, inflammato, ac putrescente, genitus.

Biliosi Biliosi humoris appellatione complectimur, & flauam bilem puram, & pituitam salſam, quę ipsa quoque, si non in forma substantiæ ali, in qualitatibus saltem repræsentat bilem.

Adhuc sanguinem tenuissimum, ac feruidissimū, quales apud Gal. 2. de arte curat. ad Glauco. cap. 1. etiam erysipelata quandoque progignit.

In quibus Omnis hic biliosus humor, sub quacumque acceptione audiatur, potest vel in venis cordi vicinioribus tantum, vel simul per putrescat omnia vasa, quę sunt inter alas, & inguina, bilis, putrescere.

Venas prope cor dicimus, quę pulmonem intertexunt, & hepar, cauam potissimum eiusdem partem, ventriculo incumbentem, ventriculum ipsum, maximeque eius orificium, vel loca ventriculo proxima, & ieiunum intestinum.

Causos Causos alius legitimus est, alius spurus. Legitimus censetur, qui ex flaua bile, aut tenui sanguine illegitimus, qui ex pituita salſa cum bilis permutatione trahit originem.

Quibus annumeratur etiam causos aliter,

ter, cum sanguis biliosus extra venas extenditur, aut attrahitur ad parenchymata, vel carnes hepatis, pulmonis, ventriculi, ubi proinde erysipelas, vel phlegmone erysipelatoses, suicitatur. Modum, quo casus generatur, docuit Hipp. 4. acut. lib initium.

Causa.

Causæ febris ardentis antecedentes sunt eadem cum aliarum biliosarum febrium causis, omnia nimirum, quæ magnum bilis proventum in corpore faciunt, eandemq; incendunt, & putrefaciunt: inprimis iter longum, & quævis alia exercitatio valida; cælo præsertim æstuoso, ac flagrantē, veluti sub caniculam: abstinentia etiam, vel nimia cibi potusq; parsimonia; aut eorundem calidiorum usus: vigilæ, curæ, mœrores, ira, &c.

Causæ
antecedentes
febris ardentis.

Signa.

Signa pathognomonica, id est, propria, satq; perpetua, sunt intensissimus calor, proprius ingens, in legitimo magis, minus in casu. notho, conspicua.

Minus propria, seu, quæ sine drophon, Signa minus propria, id est, assidentia, nominantur, computati solent.

R r

ti solent,

Signa minus propria.

De febribus biliosis.

ri solent, lingua sicca, aspera, nigra, amara quandoq; alias etiam salia: tormina, & cruciatus, ventris: in cauto bilioso aluus liquida, & pallida, deiecit; in altero à pituita salia alui fluida simpliciter meminit Hipp. in Coacis prænotionibus. Vigilæ, mentis perturbatio, seu delirium, dyspnæa. Quæ signa prout in hanc vel illam partem magis impetu fertur morbi materia, etiam ipsa euariant.

Prognosis.

Prognosis. Causos, vt vehemens admodum, ita periculolus, & brevis, est morbus.

Rarò quidem sensibus, sed tamen maiori cum pernicio, accidit.

Deplorata sanitatis auguria sunt, per Aph. 43. sect. 4 si interiora vruntur, frigent extrema, & sius adest, nigricante interim lingua. Adhæc, mali ominis est, plurimum, ac vehementer, delirare; stillicidium item sanguinis ex naribus, & quæcumq; alia excretio pauca. 2. Prorrhet. tex. 47. & cætera apud Hipp. ex prognostico repetenda.

Quomodo febris ardens finitur causos salubiter hæmorrhagiæ narium, & rigore superueniente. 4 Aph. 28. non tamen semper, nisi rigorem excipiat

incipiat alui fluxus, & vomitus, vrinæ copia, sudores. Alioquin constat ex eodem Aph. lib. tex. 46. rigorem, febre non deficiente, & gro- iam debili, incidentem minari mor- tem.

Curatio.

Copi curationis sunt biliosum humorem tum emendare, tum euacuare: intemperiem calidam, siccamq; corpori vniuerso, præsertim verò cordi, atq; hepati, inde contractam, extinguere: ac demum, si quæ sunt graviora symptomata, quæ deesse nunquam solent, eisdem lenimen adferre.

Scopi eu-
rationis.

Biliosus humor varijs modis vacua- tur, hæmorrhagia, vomitu, secelsu, vrinis, sudoribus.

Emendabitur frigoricis remedijs in- tus forisq; adhibitis, & corpore perspirabili reddito.

Hæc eadem calidam, à bile impressam, intemperiem, extinguere nata sunt.

Symptomata, quibus succurri maximè decet, sunt virium imbecillitas, vigiliæ, sitis.

His intentionibus, quæ sequitur, cu- ratio satisfaciet. Et quoniam causam du- plicem supra constituimus, prius de legiti- mo sermonem instituemus.

Vnde eu-
ratio au-
spiciat.

Rr 2

In hoc

De febr. biliofis

In hoc igitur, siue à syncera bile, siue à bilioso pendeat sanguine, dummodò vires, & ætas consentiant, venam quamprimum aperiendam arbitramur, partim refrigeria ventilationis causa, partim reuulsio- nis. Nam alioquin metus, ne is copiosior ad loca cordis vicina, propter eorundem ardorem, attrahatur, & ibidem adustus, inflama-

tionem pariat. Deinde, videmus naturam cuius rectè operantis imitatore[m] deest esse Medicum; frequenter causam hemorrhagiæ narium salubriter iudicare.

Quæ vena secanda. Emitteretur verò commodè ex vena brachij, dextra interna; nisi in pulmone, præsertim dextro, focus sit febris; quo casu antefertur sinistri cubiti vena.

Quam san- Liberalissimè porro exhauriendus est- guis, ad eum ferè modum, quem in synocho præscripsimus. Parcius in causo à flaua bile, & anni tempore æstuoso, aliisq; circumstantiis, quæ cautiore[m] nos esse iubent in deprehendo sanguine. De quibus vide Gal. lib. de rat. curan. per venas sect. cap. 13. & 14.

Si amarum fuerit os, bilis prius vomitu (v. docetur 4. de rat. vict. acut. initio) est reiicienda, & venter clysmate est subducendus.

Vbi

Vbi turget materia, primo statim die
pharmaco est opus, per Aph. ii. sect. 4. Me-
tuehdum enim, ab vltiori procrastina-
one, ne vires resoluantur, calidus febrilis,
ad sanguinem excreseat, aut humores putres-
centes in membro aliquo principe ita de-
figantur, vt eius calorem innatum sua vel
mole, vel putredine, obruant, ac perdant
penitus.

Pharmacum porro ita comparatum
sit oportet, vt sine manifesta caliditate suo
perlungatur munere. Cuiusmodi habetur
Flor. Cassie,

Elect. Diacathol.
Elect. lenit. Florenzole, addendo
pro stimulo Elect. de succo ros. vel Diac-
prun. solut. drach. j. vel drach. j. Ad ip. forma bo-
leti; vel dissoluendo in decocto prunorum, sebes-
ten, tamarindorum, in aqua endiuie, & viol.
parato.

Lauioris fortunæ hominibus exhibe-
ri potest Rhabarbari infusi drach. j. in eadem
aqua vel sero lactis, addenda syrupi ros. solut. yn-
cias duas, vel tres; aut syrupi viol. solut. diligen-
ter parati.

Quod si materia non turgcat, nihilo-
minus tunc di medicamentis erit locus,
leniendæ videlicet alui gratia; his p. se
fuerit

Turgens
temate.
ria primo
statim
die medis-
candum,

pharmas-
ca pro
paupere-
ribus.

Pharmas-
ca pro
ditiore
bus.

Non turs-
gente ma-
teria vs

De febr. biliosis

si fuerit lenis; quamvis minori paulò quantitate, & prætermisissis ijs, quæ thumi causa superioribus adiungenda docuimus. Potissimum verò id opus est factò, cum bilis multa in ventriculo, & vicinioribus locis, contenta, ex ardore, morlu, naulea, oris amaritudine, innotescit.

In principio morbi ante phlebotomiam adhibeamus. Quibus signis ante phlebotomiam adhibeamus. Alias ubi in principio morbi niter purgandum. neglecta fuerit, plenior illa purgatio in potum nullum habebit locum, usque dum coctionis notas vrina demonstrabit, ac tum demum si nullam crism ad excretionem natura attentauerit.

Quid in totius morbi decursu faciendum. Per totius autem morbi decursum adhibebuntur, quæ biliosi humoris acrimoniam, ardorem, & corporis incendium resinguerent nata sunt, quorum copiam subministrabunt nobis ea, quæ infra in ratione victus dicentur. E quibus tamen non conueniunt, vel summè frigida, vel cum frigiditate simul adstringentia. Quoniam & putredini officium, & harum febrium crism, quæ plerumque aut hemorrhagiâ, aut sudoribus, terminantur, impediunt. Atque extremè refrigerantia humores ad expulsionem ineptos

ineptos efficiunt. Stiptica verò insuper vias præcludant non solum ad crisin, sed etiam ad febris remissionem, quæ ex humorum ebullientium perspirata contingit.

Quocirca bis die, more syruporum, propinabitur conuenienter

Aqua hordei delibrati, admixto syrupo violaceo, rosaceo, de nymphæa; vel detur

Syrupus acetosus simplex,

De limonibus,

De acetositatē citri,

De acetosella,

Oxysacchara simplex; Cum aqua nenupharis, portulacæ, acetosæ, boraginis, enathæ, fragorum, quadrupla, vel sextupla.

Quoniam in hac adeo flagrante, & æstuante febre, consultum est, dulcia ista, seu saccharata, copiosiore aqua diluere, ut sic minùs promptè bilescant, quàm communiter in alijs febribus solemus, cum ipsemet Hipp. mulsam hoc casu aquosam solum exhibeat.

Potiones verò eiusmodi dantur actu frigida. Aëtius Tetrabibli 2. serm. j. cap. 28. quemadmodum etiam Arabes quidam, nihil dulce admittunt, sed pro syrupis offerunt manehaustum aquæ, in qua macerata fuerit viciaj. pulpæ tamarindorum. Verùm

Quæ lau-
dantur, &
quoties
in die of-
ferenda.

Dulcia
diluenda
copiosio-
re aqua.

Potiones
quæ con-
ueniunt.

De febribus biliosis

locum habere possunt ista in Libya, Africa, alijs meridionalibus, & ardentioribus terris partibus, nos temperatorem incolimus patriam.

Hustus
frigide
apparen-
tibus si-
gnis co-
elionis
confert.

Apparentibus iam coctionis indicijs vel perfectissime, vel saltem mediocriter, praeclarum causi legitimum praesidium est haustus frigide largior, observatis tamen conditionibus iam ante designatis: cum, ventum inhiuimus, a tali poculo non so- lum vomitu, sed & alius, sudores, lotium, subinde cieatur.

Balneum
rigidae
condu-
cit care-
as pari-
bus.
In m. so-
lum tem-
peratum
exterioro

Eodem etiam tempore vti esse queat aqua frigida balneum, quemadmodum Gal indicauit 3. de rat. vict. acut. Com. vit. si aeger est iuuenis, bene carnosus, assue- tus, & aetate media, &c. quorum si quid desit, praestat solum temperatum: quanquam in nostra regione rarius praesidij eiusmodi locus esse queat.

ra medi-
camenta
frig: cui
parti ap-
plicanda
& quan-
do,

Exterius praeter asiarum febrium mo- rem, praetermissa tamen vacatione, sta- tim inter initia morbi, frigida thoraci, ac sing: cui regionis cordis, veniunt applicanda, si quod partibus caulos legitimus fere haec cum synochro commune habet) nullas evidentes faciet remissiones, atioquin minime. Tum enim in vigore exacerbationis consultius adhi- bent.

vent. Enimvero non pectori solum, sed & hepati, & ventriculo vtiliter applicantur, si fomitem mali illic latere suspicati fuerimus. Id ipsum quoq; fiet & lumbis, & testibus.

Cardiacum epithema parabitur ex

Aque V. G. ros.

Boraginia,

Nymphaeae, an. vnc. iiii.

Aceti rosati vnc. j. s.

Vini albi odoriferi, quale est Creticum,

seu Maluaticum vnc. j.

Spec. diatrion sant.

Diamar. frig. an. drach. j.

Croci,

Camphora, an. drach. iiii. Ex hoc pannum madentes, refracta nonnihil inter manus eorum frigiditate, pectori ea parte, qua cor est situm, applicantur.

In summo ardore, & squalore, lintea decocto hordei spissiore insuccata (quod pro ditioribus ex aqua violarum, aut lactuce, vel simili paratur, pro tenuioribus ex aqua fontis) toti thoraci magnam vtilitatem induci queunt, cum subduplo, aut subtriplo olei violacei calentis. Vel unguentum infrigidans Galeni recens confectum. Admisso in preparatione succo plantae alicuius refrigerantis, lactuce, solani, &c. Quod ubi multum incaluit, mox immutatur. Vel denique mucilago seminum psyllij.

Cardia.
cum epi-
thema
quomo-
do para-
dum.

In sum-
mo ardo-
re quid
faciend.

De febribus biliosis

Unguent. Gal. in frigidans, & in
 Rosatum Mesues,
 Succo lactuce, ycha
 Semperuini, æquis partibus inter se
 contemperati
Hepaticum Hepaticum, epithema componetur ex
 Aquæ, vel succo, rosarum,
 Selani
 Cucurbita,
 Semperuini, ana vnc. iij.
 Absinthij vnc. ij.
 Pulvere rosarum rub.
 Spodij
 Trium santalor. an. drach. j.
 Aceti rosati vnc. ij.
 Camphore Gr. V. vel scrup. s.
 Huc etiam faciunt vng. santal. & rosatum
 ex aqua & aceto rosaceis prius abluta
 Galenus
 commendat cataplasma ex farina hordei cum
 succo lactuce, polygani, plantaginis, &c. subactis.
 Lumbis conueniunt iam dictum in frigidans
 Galeni, adiecto tantillo camphore, identidem
 repetendum, ne scilicet nimium incalcat.
 Genitalibus ad mouere utile est aquam
 rosarum cum aceto, & pauillo vini, confusam.
 Circa hæc porro topica in vniuersum
 diligenter attendendum, ne veniant in v-
 lum, cum sudoris erupturi signa conspici-
 untur;

Galeni
 cataplas-
 ma.
 Quod
 lumbis
 conue-
 niens.
 Genita-
 libus quid
 admo-
 uendum.
 Topicis
 uando
 q. itinen-
 ab um.

untur; maxime diebus criticis. Vide Gal. 3.
de crit. cap. 3.

Ad symptomata; quæ magnum in hac Quæ præ
febre Medico negotium faciunt; præci- cipua hu
puè pertinet virium imbecillitas; quæ ta- ius febris
moti congruente victus ratione, de qua sympto-
mox, emendatur; porro tamen alijs quoq; **mar.**
modis haud parùm fulcitur. Huc igitur spe-
ctant epithemata iam dicta, & odores gra-
ti ex rebus refrigerantibus, aut temperatis,
excitati. Item quæ peculiariter restauran- **Restau-**
tia dicuntur, conseruæ, condita, destilla- **rantia vi-**
ta, decocta, pulueres, & alia formula pas- **res.**
sim apud auctores exposita. De conseruis
præferuntur alijs;

Conser-
uæ.

Rosarum,
Violarum,
Nymphaeæ,
Boraginis,
Iulibæ, quibus permisceri queant:
Species diuinae frig. & parū aliquid
Confectionis Alchemes.

Decocta.

Ex decoctis istud inter alia efficacissi-
mum est: **Conseruæ ros.**
Boraginis an. m. j.
Conseruæ viol.
De florib. nymph. an. m. f.

De febribus biliosis.

Spec. diamarg. frig. drachm. iij.

Fol. auri num. 4.

In sculi capi sufficienter elixi lib. s.

Aqu. rosar.

Violar.

Nymph. ana vnc. iij.

Omnia in vase

vitrea diligenter obturato ponantur, & in

B. M. leniter coquantur. Dosis ex colatilis

quoris sapiuscule cochlear. j. Inter pulmo-

res primas meritò sibi vendicat, qui ex

margaritis in succo limonum, aut citri, dis-

solutis concinnatur: quem in aqua capoa-

nis, aut boraginis, vel diluti vini cantilo,

aut conseruis cordialibus, aut iulepo quoa-

piam iucundi saporis, præbere possumus.

Peruigilium moderantur, & somnum

conciliant, unguentum rosatum. Mesues, aqua

rosata ablutum, & cum duplo ungu. popul. ad in-

flar cataplasmatibus linteis inductum: sicq; vt fro-

tem, & tempora, complectatur, adhibitur.

Præterea extremorū lotio bis die fa-

cta ex

Decocto flor. viol.

Nymphar. i.

Anethi, i.

Cortic. radic. mandrag.

Folior. salicis, i.

Lactuce ana M. j.

Semi-

Lib. Caput viii

27

Seminum hyoscyami albi vnc. f.

Capit. papau. albi cum seminibus

num. X. preparato.

Cum noctu cubare volet

℞. Syrup. de papau. vnc. i. vel ij. cum aq.

Nymphae, violar. lact.

Succum, cremorem, aut emulsionem ē semi-

num papaueris albi drach. 2. 3. 4. additis paucis

aliquot amygdalis dulcibus excorticatis, cum aq.

simpl. calida, aut quod prestantius est, decocto

hordei, paratam: adiecto, si dulcibus ager dele-

atur, subinde saccharo, aut iulepo violaceo,

Quibus tamen omnibus prestat diacoeon

Gal. ad vnc. f. drach. ij, aut, si vetustum est, vnc.

j. datum.

In pertinaci vigilia, quæ phreniudis

metum incutiat, aliquid verè, ac propriè,

narcoticorum præbere tentandum est, ut

sunt:

Requies Nicol.

Philonium Romanum,

Pilule de cynoglossa,

Theriaca recens, &c. A quibus ta-

men, veluti antè monuimus, ex Gal. de

cris. temperandum erit, vbi signa imminen-

tis hemorrhagiæ cruce lele proferent.

Situm compescunt:

Lactuca, vel

℞. 2.

Poru.

Eundo.

cubitum.

quid sua

men.

dam.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

De febr. biliosis

*Portulaca recens in aceto preme-
cerata, & commansa, aut
Citria mala, vel
Limonis, orbiculatim concisi, sac-
charoq; respersi,
Pulpa tamarindorum ore retenta, item
Psyllij mucilago, ex aqua viol.
deprompta, & cum s. q. calidissimi sacchari
in mortario ad albedinem usq; agitati, cuius
mixturæ crebrò quippiam ore versandum
est.*

Multum quoq; ad hanc rem faciunt
fontes aciduli, quibus locis commodè ha-
beri possunt: quos hodie nonnulli dexterè
imitantur aliquot guttis olei vitrioli, aut
sulphuris correcti, in frigidam coniectis, be-
neq; inter se mixtis, atq; agitatis.

Vsu insuper, & experientia, constat,
plurimum in hoc genere posse epithemata
omnis generis, paulò ante descripta, si qua-
ritatem aceti in compositione auxeris. De
cæteris, quæ passim in Pragmaticorum li-
bris prostant, nihil in præsentia.

**Dieta
qualis.**

Dieta in vniuersum frigida & humida
esse debet. Quocirca cubet æger in loco
frigido, suauis auræ exposito, atq; si res pa-
tuitur, ad Septentrionem conuerso: corpus
tamen interea iniectis fragulis contega-
tur,

tur, fiat flabello ventulus, aqua gelida de vase in vas assidue transfundatur, & eadem pavimentum sæpiusculum conspergatur: cuius loco pro ditioribus aquam rosaceam, & acetum effundere licebit, hisdemq; imbuta lintea ex parietibus suspendere.

Inferuntur etiam cubiculo utiliter plantæ refrigerantes, violæ, rosæ, flores nymphææ, iunci, lactucae, portulacæ, folia vitis, frondes salicis. Non admittantur multi homines simul ad decumbentem, quorum halitu aer incallescere potest. Præstat quoq; in lecto ampliori iacere, ut quis commodè huc illuc se transferre queat.

Cibus esto pisanæ hordeaceæ, cremor lactucae, cucurbita cocta. Apud nos ob consuetudinem paulo plenius cibare oportet; ac proinde permittimus insculæ gallinaceorum pullorum in cocto hordeo, vel folijs lactucae, acetosæ, portulacæ, alteratorum, aut tantillo aceti rosacei, succi limonum, citri, &c. addito. Permittitur etiam gelatina, sine cinnamomo, & aromatis, parata.

Pro potu utatur decocto hordei, aut aqua fontana cocta cum syrupo, iulepo, aut petasæecharo violato, aut rosato; prodest etiam fontana, in qua maceratus fuerit panis ex alterâ aqua prius elotus, Vel quæ sequitur oxysæchara.

De febribus biliosis

℞. Aquæ font. lib. iij. ꝑ. j.

Sacchari albi vnc. ij. ꝑ. j.

Coquantur ad consumptionē lib. vnus, adijciendo in fine coctionis aceti acerrimi vnc. ij. Misce.

*In vigore
re potus.*

In vigore autem, seu statu totius morbi, nullus aquæ simplicis potus æquiparari potest.

*Aluus, ni
leuis sit
clysmate
subdu
cenda.*

Aluus, nisi sponte respondeat, alterius diebus leni, ac refrigerante, clysmate est subducenda; cuiusmodi paratur ex sero lactis, & decocto violariæ, malvæ, endiviæ, cum melle, & oleo violaceis. Hactenus de causo legitimo solo, ac per se, infestante. Qui enim inflammatorios ulcerum affectus commutatur, non hic inter febres, sed in particularium morborum curatione locum promeretur.

C A P V T I X.

De causo notho, seu, febre ardente spuria.

*Causos
spurius
quando
generatur.*

Causos spurius, qui propterea, quoniam in fine Hyemis & Autumni potissimum affligit, hybernus etiam dicitur, loco quidē generationis à legitimo dicto non discrepat, materia tamen discrepat, constat enim

ē pituita

ē pituita falsa, vel sola, vel bilis admisione adulterata.

Causa.

Causas igitur habeat mixtas necesse est, quæ partim bilem, partim pituitam, tum faciant auctiorem, tum putrefaciant, & accedant. Vt cum quis v. G. ætate, temperamento calidus, in septentrionali regione, causo corripitur.

Accidentia, seu symptomata, quæ in hoc, quam genuino, mitiora, ac veluti dimidiata tantummodò sunt.

Causa
quæ.Symptoma
mata
qualia.

Signa.

Signa huius mali apud Hipp. 4. de rat. victus acut. t. 13. sunt: alius soluta, sitis magna, nondum tamen prorsus implacata, seu (vt loquuntur Scholæ) extensa magis, quam intensa. Adhæc, lingua arida, aspera, & falsa: Urinæ paucæ comparatione causi legitimi, ac minus procedentes, ob pituitæ lentorem & crassiciem scilicet. Adest insomnium, sed longè hîc mitius, propter vaporosam pituitæ naturam. Addit extremorum refrigerationem, quod de lethali

Signa
quæ.

T t

tamen,

De febribus biliosis.

tamen, ac maligno, causo accipiendum, ob viscerum inflammationem, & natui calori, imbecillitatem.

Prognosis.

Prognosis.

Epid. 5. sect. 2. t. 85. mitio. em hunc facit Hipp. priore. Solutur & ipse hemorihagia natum, atq; aliarum febrium pituitolarum ritu, paronidibus, vel ab icteru, post aures enato, iudicatur: tum etiam dolore coxendicis, aut cruris, & ipso crassiusculo; quæ tamen omnia magis adstricta, quæ fluente, alio accidunt.

Curatio.

Curatio.

In hoc casu venæ sectio non adeo necessaria per se est, nisi cum pléthorica dispositione iungatur: sed nec potus frigida, neq; alia actu, aut virtute, impensius refrigerantia ex usu sunt.

Trallianus lib. 12. cap. 3. temperationi quadam, seu miti, ac tepido calore prædicta medicamenta commendat, cuiusmodi in externis epithemata, vel cataplasmata, ex seminibus lini, sanuigræci, farina hordei, fabarum, chamæmelo, meliloto, &c. quæ antè parari.

Humor

Humor febrificus, obseruata semper coctione, & motu naturæ, temperationibus remedijs tractandus est, vt sunt inter præparantia: oxymel, mel rosatum simplex. De Præparantia.
purgatium classe, agaricus, rhabarbarum, po-
lypodium, atq; his similia; quorum farragi- Purgan-
nem in curatione tertianæ spuriæ reperire tia.
licebit.

Victus ratio quemadmodum minus re-
frigerans, ita paulo plenior, permittitur. Victus
ratio.

CAPVT X.

De tertiana febre continua.

Tertiana continua fit ex bile putrescen-
te in vasis minoribus, & a corde non-
nihil remotioribus: nunquam ad verā apy-
rexiam, seu, omnimodam intermissionem,
perueniens, tanetsi tertio quoq; die tantu-
isperde vehementia, & ardore suo, remittat;
adeoq; ægrum respirare quadamtenus si-
nat. In tertia-
na coi-
tinua
qualis
putresce
humor.
& in qui-
bus vasis.

Causa.

Causas tam internas, quam externas eas-
dem cum febre ardente sequitur, nisi
quod hic sint leuiiores, & bilis minus sit in-
flammata, contineaturq; in vasis, velut an-
te monuimus, a corde paulo magis distan-
tibus. Cause
huius fe-
bris quæ.

De febr. biliosis

tibus. Vnde etiam euenit, vt alternis diebus, parte aliqua bilis putridæ per patulos cutis poros exhalante, febris remissior fiat: mox verò eadem bile, exustione sanguinis denuo accumulata, nouus insurgat paroxysmus, ac tertio quoq; die febris redintegretur.

Signa.

Signa fe-
bris ter-
tiane
contiz
auræ.

Signa tertianæ cōtinuæ sunt: inuasio sine frigore, horrore, rigore; adest totis magnus; affligit cephalalgia, adsunt, delirium, vigilæ, linguæ ariditas, quæ flauo interim calore tincta est, interim etiam nigricat; vrgent sitis, & ventris constipatio; exspiratio maior est inspiratione; pulsus celer, frequens, inequalis; vrina rubra, vel flaua, tenuis consistentiæ, atq; ignea, quæ initio non nihil turbida videtur: in summa: omnia ferè, quæ in causo dicta fuere, hic quoq; se produnt indicia; nisi quòd mitiora sint, & alternis diebus crescat febris, alternis decrescat.

Prognosis.

Prognos-
is.

Hæc febris semper cum periculo iuncta est, ob ipsam tum continuitatem, tum acumen; minis tamen ardente vocata lethalis habetur.

Para:

Paratiora in hunc morbum, velut etiam quousvis alios biliosos, (teste Gal. 8. Meth. c. 8.) sunt corpora, quæ temperamentum huic febrili calidum siccum, vel iecur saltem calidius, obtinent, habitu gracili, ætate iuuenili, laboribus corporis, ardoribus, curis, vigilijs, &c. exposita, victui parco, calido & sicco, adsueta, maximè ætate, & in calidis siccis cæli plagis habitantia, aère præsertim æstuoso: adhuc quibus euacuatio seu spontanea, seu artificiosa, alias consueta, fieri desit.

Curatio.

Curatio tertianæ continuæ à causâ the-rapeia nil discrepat, nisi quod leuius refrigerantia præsidia (de quibus etiam in sequenti capite, de tertiana intermittente, aliquid) & victum nonnihil plenior, exigat. Vbi verò crisis iam præfens est, tum in hoc, tum alijs quoque morbis, ab omni medicatione abstinere decet, ipsiq; naturæ totum committi negotium.

Curatio discrepat

Vbi crisis adest, medicandum non est.

CAPVT XI.

De tertiana periodica, seu, intermittente.

T 13

Terti.

De febr. bilioſis

Intermittens ex quo generatur humore et in quibus conſineatur vaſis. **T**ertiana intermittens dicitur febris, cui bilis occaſionem præbuit, vel extra vaſa, vt voluit Capivaccius lib. 6. Prax. cap. 29. & Trincavellus Com. de art. curat. ad Glauc. cap. 7. vel intra vaſa, minora ta-
men, quæ a minoribus ad maiora pro-
pellatur, vt Cardano lib. de cauſis, ſig. ac lo-
cis morborum, prima parte, paragrapho 29.
Hemithæus, &c. & Fernelio 2. de abditis
rerum cauſis cap. 13. placuit, alicubi in cor-
pore putreſcens, ac tertio quoq; die aſſi-
gens, ad infebricitationem autem alternis
perueniens.

Quoties in duplice ſolet eſſe differentia.
Hæc in duplice ſolet eſſe differentia.
Vel enim humor morbiſicus eſt ſolus, ac
ſyncerus; & tum gignit tertianam exquisi-
tam: vel miſcellâ alicuius alterius ſucci de-
prauatus, & prodit ipuria, aut notha tertia-
na communiter dicta. De priorum præſen-
tia, de altera verò deinceps, agemus.

Cauſa.

Cauſas tam internas, quàm procatarcti-
cas, tertiana agnoſcit eaſdem, quas ha-
bet ardens, omnia videlicet, quæ maiorem
bilis in corpore prouentum parare queunt;
de quibus iam antea, neq; enim materiâ,
ſed

sed solo putredinis foco hæc ab illa discre-

pat.

Ut porro tertiana exquisita gignatur, Quæ res
necesse est causas allegatas vel omnes, vel quitan-
potissimas certè, temperamentum scilicet, tur ve
ætatem, victum, regionem, statum cœli, hæc fe-
tempus anni, biliosa, seu calida sicca omnia, bris gene-
in vnum conspirare: alioquin pura, ac me- retur.
ra bilis, cui hæc febris originem suam de-
bet, laud generabitur.

Signa.

Signa in multis conveniunt cum notis ter-
Stuanæ continuæ, propriè tamen hanc Septem-
præ alijs designant, & veluti digito mon præ alijs
strant hæc, quæ sequuntur, septem: Modus signa
invasionis; qualitas caloris; pulsus; urina; hanc ac
paroxysmi duratio, atq; terminatio; circui- desse no-
tus; similitudo morborum populariter gra- tant, quæ
fantium, propria
illi sunt.

Nam, quantum attinet ad primum, Quomodo
inuat hæc febris statim inter initia cum do inua-
vehementi rigore; qui rei acutæ corpus die hæc
vulnerantis, atq; pungentis, sensum præ- febris.
seferat.

Qualitas caloris aëris ad tactum, vn- Calor
de febris ista caufodes, seu quæ caufon re qualis
præsen-

De febribus biliosis

Quomodo calor
ardentis
et inter-
mittens
tis diffi-
rat.
Calor in
vigore
per totum
corpus ex-
panditur
Pulsus
qualis
inchoan-
te inua-
sione.
Qualis
est idem
in au-
gmento.

presentat, à Gal. 2 de diff. febr. cap. 3. ap-
pellatur. Verum ea inter vtrumq; est dif-
ferentia, quod estus ille in hac primo lo-
cum occurſu appareat: deinde paulò post
sub manu contrectantis remittat, & mitis
getur: in ardente autem semper sibi similis
perseueret. Idē calor in vigore febris (quo
tempore symptomata etiam omnia, sitis, æ-
stus, &c. ingrauescunt) æqualiter per totū
corpus expanditur, extremis artubus, non
minus ipso thorace, feruentibus.

Pulsus inchoante inuasionē debilis
est, paruus, tardus, rarus, minus tamen
quàm quartanæ: quinimo tarditas à statu
naturali proximè distat. Ordinatus item
est, & æqualis, tam in vno, quàm pluribus
ictibus: sed in augmento protinus euadit
magnus, vehemens, celer, frequens; omnis
inæqualitatis, præterquàm febrilis, ex-
pers. Est autem febrilis inæqualitas, vt ce-
leriore habeat systolen, quàm dyastolen.
Id quod putridas febres omnes, ceu charac-
ter quidam, obſignat.

Vrina
qualis.

Vrina, vt inquit Aëtius Tetrabib. serm.
5. cap. 19. cholericæ est, seu rufa, eademq;
primis diebus nubeculam, vel enæorema
laudabile ostendit.

Paroxi-
smus quan-
tus.

Paroxylmus 12, horas vix excedit. Aui-
cennas

cenas (j. quarti tract. 2. c. 35) ait à tribus ad duodecim, quandoq; à quatuor ad quatuordecim, accessiorem extrahi; communiter autem 7. horis absolui; quæ de nostra solum tertiana, seu inexquisita, inaudire par est. Quod si producat paroxysmus ultimus, tertiana simpliciter, & citra adiectionem, atq; quò quies breuior ipso paroxysmo fuerit (qui aliquando ad 18. 24. 36. horas ascendit) tantò magis extensa tertiana nominatur 2. de diff. febr. cap. 8. Peculiare insuper huic morbo est, finire paroxysmum sudore, vomitu, deiectione alui, biliosis.

Circuitus tertianus est, seu, febris tertio quoq; die reuertitur. Attamen huic signo, quod à numero dierum petitur, parum firmitatis inest: proinde bene Gal. monet, j. de diff. cap. 10. *Præstat febris ipsius modum, & formam, diligenter considerare, cum ex hac ipsa febres dignoscantur, haud aliter quàm homines ex figura, & propria forma, cognoscuntur.*

Postremum signum à simili petitum, Signum nempe, si febres tertianæ id temporis passim in populum grassantur, non iniuria sua à simili petitum, spicari licebit, febrim, quæ tum affligit, tertianam potius fore, quàm alterius generis.

Prognosis.

V u

Tertiana

De febribus biliosis

Prognosticum.

Quot peritis finiat.

*ad huc in
aliquo*

Quid primo die ex urina coligitur.

*etiam
etiam
etiam*

Quanto exquisitor breuior.

*etiam
etiam
etiam*

*etiam
etiam
etiam*

*etiam
etiam
etiam*

Tertiana exquisita periculum haud minatur, j. Epid. sect. 3. cap. 8 & j de art. curat. ad Glauco cap. 8. atq; eadem celeriter finitur, quoniam septenas periodos, quod longissimum est, non excedit. 4. Aph 49. potest enim, & vero etiam quandoq; soler paucioribus paroxysmis, terminari, & quæ admodum Auicenna j. quarti citato cap. 27. ait, ob materiæ subtilitatem, subinde in unica accessione hanc febrem consumi, ubi vel vomitus, vel fluxus alui superuenerit.

Quod si primo statim die urina nebulam albam, aut enæorema, monstrauerit, significatur febrem ultra quantum circuitu non progressuram; atq; adhuc citius densaturam, si pro nebula hypostasis laudabilis primo die conspiciatur.

Quanto exquisitor est tertiana, tanto breuior, & curatu faciliior, erit. Vbi autem in septimum usq; paroxysmum extrahetur, tum statum, seu rigorem, idcirco symptomatum omnium grauissimā exacerbationem, in quarto habebit; quod idcirco monere voluit, ne si vel aperta circa id tempus uena, vel propinatum fuisset medicamentum, vehementia illa accidentium tunc emergentium medicationi potius, iniuriā tamen, quam morbo, imputetur.

Curat.

Curatio.

SCopi curationis cō spectare debent, quemadmodum in cauto monuimus, ut ^{Scopie} flauæ bilis feruor, atq; putredo, inhibeatur, ^{curationis} corporis ex ea concepta caliditas immodi- ^{in quibz} ca ad contrarium permutetur: quod par- ^{consistit.} tim euacuantibus, partim alterantibus, asse- qui poterim^s, atq; ijs etiam, quæ obstructi- ones expediant, sinē euidenti excalescē- ne, ne videlicet febris inde sumat incre- mentum. Cuoniam hñ corpus peruium, ac perspirabile, efficiatur, frustra in expu- gnanda putredine laborabimus.

Curatio, si sponte aliud officium fe- ^{Curatio} cerit, incipiet, quietis tempore, ab eiudem ^{unde, &} lenitione, aut irritatione: sollicitabitur glā. ^{quo tem-} de subacta, vel, quod præstat, molli clysmate ^{pore aus-} e sero lactis, hydreleo, & saccharo, vel modico ^{spicanda.} mellis, aut ex decocto violare, maluz, hordei, mel- le rosato, oleo violato, cum tantillo salis concin- nato.

Instante iam paroxysmo, si quidem vo- ^{Instante} miturit æger, iuuandus potu aqua simplicis, ^{paroxys-} aut hordeaceæ, cui parum quid aceti fuerit ad ^{sino quid} mixtū, vel syrupus acetosus, vel oxymel simplex. ^{faciendū.}

Huc etiam digitus facit, vel penna oleo imbuta faucibus inserta.

De febribus biliosis

In paro- Alioquin quamdiu durat paroxysmus
xyismi- nil aggrediendum, & cum à somno, tum ci-
hil mol- bo, potuq; si fieri queat, ad vlc; inclinatione;
liendum nem accessions abstinendum; nisi æger fu-
erit picholos. Quo casu, & proximè ante
paroxysmum, & eius quocunq; tempore, ad
præcauendam vel lypothymiam, vel lyncop-
pen, aliquid cibi, potusq; offerre docet Gal-
10. Meth. cap 3.

Virgente Vbi sitis clamosa vrget, expanso iam
siti quid in totum corpus calore febrili præbere pos-
dandum terimus iulebrosatum, aut conserue ros. vel vi-
olarum (nisi fortè profluuium ventris adsit)
dilutum aqua fontana laudabili; aut leuiter cocta,
in qua panis emaduerit aliquandiu, aut hordeata.
Quinetiam eam colluere, vel ore versare, prode-
rit, quæ sitim tantisper fallunt, vt sunt: pruna,
passule, cerasa acida in aqua præmacerata, alia-
que, quorum capite de causo facta est men-
tio.

Ad lenis- Ad leniendum verò rigorem, panni
endum calentes spinæ dorsii, hypochondrijs etiam
rigorem fomenta, commodum admovebuntur. Pro-
quid fa- bantur quoq; desinente iam rigore, leues
ejedum. quedam extremorum frictiones, quæ febrilis æ-
stus expeditius è corporis penetralibus for-
ras erumpat.

Declinã- Declinante paroxysmo, si nausea, &
vomen-

vomendi desiderium, teneat, titillentur fau- te parox-
tes eo modo, quem in principio accessio- xysmo
proposuimus. quid ag-

Sin ad sudores paratum sit corpus, isdem grediens
opera dabitur, pluribus stragulis, ac tegumen- dum.
tis, intestis, & epota aqua hordeacea adhuc calida;
aut decocto milij integri, adiecto postea subduplo,
aut subtriplo, vini albi, quem Syrupum S. Ambro-
sij nominant. Hæc in paroxysmo.

Extra paroxysmum ita procedi debet. Extra pa-
Tempore in febricitationis, seu quietis, sta- roxy-
tim in principio, primâ corporis regio leni- smum.
ter expurganda venit; præsertim si nausea, quomo-
oris amaritudo, & alia huius generis, quæ do proce-
ventriculi, ac vicinarum partium, impuri- dendum.
tatem denotant, adfuerit. Id autem dextre
præstabunt:

Cassia fistula,

Tamarindorum pulpa,

Syrupus violatus solutivus,

Syrupus rosarum solutivus,

Elect. lenitivum,

Infusum rhabarbari ex aqua endiuivæ, &

Syrupo de cichorio simplici, aut de
cichorio cum rhabarbaro.

Manna item ex decocto tamarindorum,

flor. violarum, & endiuivæ soluta,

quæ in robustioribus elect. de psal-

V. 3

lio,

Medica-
menta

purgan-
tia

De febr. biliosis

lio, aut elect. de succo rosarum
drach j. vel circiter, aut Gr. j. aut
altero diagridij, exacui queunt.

**An vena
secanda
in hac fe-
bri,**

**Si exqui-
sita sit
tertiana
sanguis
mittens
dus.**

**Venæ se-
ctio mul-
tiplex re-
medium.**

**Quo tē-
pore m-
bi, & quæ
vena ape-
rienda.**

Missionem sanguinis pleriq; in dubiū
vocant, eo quod vires cum hoc morbo mi-
nime constare posse videantur. Nam febris
ista biliosis solum corporibus, macilentis;
cælo, anni tempore, ac regione, æstuosis
accidit. Quibus sanè subscribimus, ea ta-
men animaduersione adhibita, quod et in
nostra patria exquisitissimæ illæ tertianæ,
ob rationem victus, & alias, quæ desideran-
tur, conditiones, rarissimus sit affectus; si
tamen forte fortuna contingat aliquem hac
febre, licet impuriore quadam tenus, pre-
hendi, huic phlebotomiam non iniuriā
profuturam arbitramur, ratione saltem cau-
sæ antecedentis, ne scilicet sanguis tenuio-
ri parte sui per ardorem febrilem bileat;
præsertim, cum venæ sectio (quemadmo-
dum liquet ex valesio lib 7. Contr. cap. 2)
multiplex sit remedium, & quotidiana testi-
tur experientia, sanguinis missionem, tem-
pestiuè factam, plurimum prodesse, ac mor-
bum, sæpè radicatus extirpare. Vbi ventricu-
lus igitur, & primæ viæ, a medicamento
sunt depuratæ, aut si quidē illuici in huius
partibus nulla extant indicia, sub nostro
quidem

quidem cælo statim per initia febris, tamen extra paroxysmum, vel cum ægri vires robustiores sunt, horis minimum 4. aut 5. priusquam accelsio fiat, vena iecoraria dextra, aut communis, aperietur.

Quibus autem istud, impediente vel ætate, vel viribus, facere non permittitur, his *Scarificatio* vicaria esse potest scarificatio.

His ita peractis, si paroxysmus insequens priore breuior, & quod ad symptomata attinet, leuior sit, vini quoque corrigantur, totum negotium soli naturæ committi queat. Tamen si non abs re, pro naturæ adminiculo, remedia quædam viurpabimus, quæ cum refrigeratione extenuent, & obstructions eximant; qualia censentur:

Radices cichorii,

Plantaginis,

Acetose,

Endiuæ,

Agrimoniæ,

Graminis,

Semina Maiora, & minora; cum

Syrupo capillorum Veneris, de cichorio

simplici, acetoso simplici, &c.

Exhibentur autem apozemata eiusmodi *Tempus* die in febricitationis ieiuno, quatuor nimirum *exhibenda* horis ante prandium. Possunt etiam toti *di apozemata* dem,

De febr. biliosis

matum. dem, vel pluribus, ante paroxysmum horis
hæc eadem offerri.

Non mi- Quod si paroxysmus à phlebotomia
tescente nil mitescit, neq; natura vacuationem ali-
à phleb: quam bilis adonitur, aut, si quam adonitur,
paroxys- non perficit, dummodò vrina coctionis
imo quid notas (vt in hac febre asolet fieri) præse-
faciedum. ferat; pharmacum, quale initio præscriptu-
mus, vel paulò fortius, præscribendū erit;
interpositis nihilominus apozematis iam
nominatis, in nostræ præsertim regionis

Quoties
pharma-
cum ite-
randum.

hominibus, cum sub hoc cælo tertianæ pu-
ritatem illam non seruent, idq; ter, & am-
plius, vtiliter iterato, ne in præsens vtcunq;
suppressa potius accessione (quemadmo-
dum vulgi mos fert) quam euulsa febre, re-
liquiæ morbificæ grauioribus malis funda-
menta iaciant.

Desinens Sed & desinente prorsus febre, super-
te febre stite tamen aliquo eius accidente, vt siti, do-
superstite lore capitis, inappetentia, omnino necessa-
manens ria est purgatio eiusmodi, ad præcauendam
te aliquo scilicet recidiuam, 2. Aph. 12.
accidente

quid fac- Cum ardor summus, & intensissimus
ciendum. est, velut in tertiana exquisita esse solet, tum
Calore in alterationi, seu refrigerationi, maior quam
summo e- euacuationi, danda est opera. Vnde plera-
xistente, que in capite de causo annotata, remedia eo-
tiam

Lib. Caput xi.

37

tiam hîc habebunt locum ; soletq. post co-
 elionem, haustus frigida, modo illic expli-
 cato, concedi. Quò respiciens Gal. j. de ar-
 te curat ad Glauc. cap. 9. in curatione hu-
 ius febris, nullius purgantis pharmaci me-
 minit, sed tantùm *absinthij dilutum ex aqua*
mulsa docuit exhibendum, monens interim,
 & sudores, & vrinas ciendas. Verùm sudo-
 res rectius declinante accessione, vrinae
 autem intermissionis die, felicius prouo-
 cantur. Ad ciendas porrò vrinas facere que-
 unt descripta superius apozemata, quæ hu-
 ius proposito melius seruiunt, si adiciantur
radices petroselini, & fœniculi; quas præstat
 horis aliquot in aceto præmaceratas vsur-
 pare. Galenus his substituit apium, & ane-
 thum. vnde ad Trallianum lib. 12. cap. 6. eu-
 nimis calefacientia adhibens carpitur. Pro
 Galeno tamen non ineptè respondebitur,
 hæc quamuis per se calida, cùm humorem
 biliolum eliciunt, & obstructions referant,
 ex accidenti refrigerare. Deinde tum pri-
 mum ea dari, cùm cognoscitur, naturam in
 has partes materiam destinasse; quocirca
 nequeunt diu in corpore morari, & per co-
 sequens, minùs calefacere queunt.

Absinthium porrò alijs medicamentis
 anteponitur, quoniam præter id quòd bi-
 lem ex-

alterant
 dum &
 refrigeran-
 dum po-
 tius quã
 purgan-
 dum.

Sudores
 quando
 prouocan-
 di & vrinae.

Medica-
 menta vrinas cie-
 tia quæ.

Gal. à re-
 prehensio-
 ne vindi-
 catur.
 Quando
 medica-
 menta vrinas
 cientia
 danda.

Absinthium
 alijs

De febribus biliosis.

medica. lem expurgat, stomachum etiam, qui in
mentis bi- præsentia plurimum à bile lædi consuevit,
lem pur- roborat, in quo pl^{us} est utilitatis, quam in il-
gantibus lo qualiquali calore incommodi.
& urinā
monenti- Symptomata hic ferè sunt eadē, quæ in
bus ante causo: de dolore capitis tantum, de quo quia
ponitur. nihil ibi, hic pauca adiciemus.
Sympto- Is ubi pulsatorius est, à missione sangui-
mata. nis cōquiescit. Sin è vetriculi aspiratione na-
Dolor ca- tus, vomitu, aut deorsum purgante cholagogo,
piris san- sedatur. Si è toto corpore vapores in cere-
guinis brū feratur, is sunt à capite auertēdi frictions
missione bus platarū ex sale, & aceto, chysteribus leuibus,
conquies- cucurbitulis item, quæ scapulis, atq; claviculis,
feit. imponuntur; lonionibus extremorum ex
Extrema Aqua decocti lactuce,
lauanda.

violaria,

Florum nymphae,

Foliorum vitis,

Salicis,

Capitum papaueris albi. Cui decocto, actu calenti immergendæ sunt tibiae, & brachia, vsq; ad cubitum.

Caput ros- Caput insuper roborandum, vt euapo-
boradum. rationes illas à sese arceat, quæ, declinante nonnihil dolore, moderatè discutiendæ, at-
que resoluendæ sunt. Roborat caput oxyr. ex quinq; partibus olei rosati, & vna aceti cōcin-
borantia. natum. Vcl

℞. Aqua

Libr. Caput xi.

38

℞. Aqu. rosarum,

Plantag.

Solani an. vnc. iij.

Olei rosati,

aut aqua ros. abluti vnc. j. f. Omphas

cini recentis, Aceti rosacei tantund.

Pulueris santal. rubr. drach. j. f. misc.

Vapores autem capiti impactos blandè dissipant, & consumunt, lumbrici terre triti, atq; cum olco ros. subacti. Adhæc, aqu. ros. aut solari, & meliori, addito sale, crocòq; e quibus madetes panni suture coronali, ac frontii, imponantur. Item emulsio nucleorum Persicorum, cum aqu. rosar. & belonice facta, momentoq; thuris leuigati adiecto. Vel oleum chamemelinum cum rosaceo illitum. Huc etiam spectant: syrup. de papauere vnc. j. f. cum aque lactuce vnc. iij. duabus à cæna horis dormituro propinatus, atq; epithemata cardiacæ, simul & hepatica refrigerantia, iam antè descripta.

Nam quatenus viscerum istorum ardorem temperant, eatenus quoq; acrium fuliginum prouentum, adeòq; in cerebrum ascensum, prohibent; & sic quasi per indirectum hîc quoq; sunt vsui.

Aër debet esse similis illi, qualè in febre ardente descripsimus, hoc est, frigidus humidus.

X x 2

Pro

Vaporib9 dissipans
dis quæ
conueniant.
Quid capiti applicandam, & cui parati.
Aegro dormituro quid propinandum.

Viâustratio, Aër

De febribus biliosis

qualis cō-

ducat.

Fercula

quæ con-

ferant.

Olera quæ

præstant.

Oua.

Carnes

quales cō-

ueniant.

Gal. quæ

lia edulia

probat.

Piscibus

quib. ve-

scendum.

Alimonia

quomodo

preparata

& condi-

ta.

Pro ferculis inferre licet *ptisana cremosa*, seu *hordeum ad molliciem coctum*, coloqu^{intida} *transmissum*.

Olera item, *lactucam*, *portulacam*, *endiu^{iam}*, *acetosam*, *spinachiam*, *maluam*, *atriplicem*, *ci^{thareum}*, *choreacea* in vniuersum omnia; quæ rectius cū carnibus elixantur, vt iuri dein vires suas imprimant.

Oua adhæc *tremula*, *aceto condita*.

De carnibus conueniunt teneriores, minime pingues; & in auium quidē genere molliores, vt pulli *gallinacei*, in dumetis degentes, *passerculi*, *perdices*, *phasiani*, &c. ex ijs verò, quæ minimè tales sunt, alæ.

Galenus concedit *cerebella porcellorū*, & *pedes molliter elixos*, non quidem indiscriminatim omnibus, sed ijs tantummodò, qui præ nimia ventriculi caliditate, cibos coctu faciliores, aliàs essent corrupturi.

Ex piscibus prædicantur *saxatiles*, *perca*, *lucius*, *trutta*, *mulus*, *barbatus*, &c. pro quibus substituere poterimus minutulos illos, quos Germani *fundulos* vocitant. Et verò hæc ipsa decet esse elixa solū, non tosta, non frigida in butyro, vel oleo, non multo sale, aut aromatis, conserpta, vel melle addito, edulcorata, cū acris omnia, salsa, & dulcia, hęc merito suspecta sint.

Ex

Lib. Caput XII.

39

Ex arboreis fructibus præ cæteris conce-
duntur, vae bene maturæ, magis tamen pensiles,
ficus, item, pruna, & poma cocta. Verum
ista reliquis edulijis præmitti par est.

Die paroxysmi carnibus, & ouis, inter-
dicitur; quamuis nunquam ventriculus
multo cibo infarciendus, ac onerandus, sit; nes & oua
etiam die quietis, vt habet Hipp. 2. Aph. 10.
& 7. Aphor. 62.

Pro potu, ante perfectam morbi decli-
nationem, vinum & generosum, & valde e-
tiam aquosum, nocere solet; proinde vel ex
decocto hordei cum passulis, vbi maior est ar-
dor; vel radicibus cichorei; aut cum passulis, &
hordeo, cinnamomi tantillo bulliente, paratur
poculum.

Aluum expedit esse liberam, aut die, quo
febris adest, leni clysmate clui; quod omni
die infebrecitationis vtiliter iteratur, cum
æger medicamenta per os sumere renuit.

Vigilijs pertinacioribus iam supra feci-
mus medellam.

Animi affectus grauiores, iram præfer-
tim, mœrorem, nimiamq; sollicitudinem,
studiosè deuitare expedit. Hactenus de ter-
tiana intermittente legitima.

CAPVT XII.

XX 3.

De ter.

De febr. biliosis
De tertiana intermittente
notha, seu, spuria.

Notha tertiana quibus humoribus constat. Febres maioris & minoris famæ quæ.
Tertiana notha, seu spuria, intermittens est febris, è miscella alterius alicuius humoris cum bile, prodiens. Humor is, qui bilem adulterat, est vel pituita; & nascitur maioris famæ spuria, eo quod frequentius accidat; vel melancholia, & minoris famæ, seu rarior ab Arabibus nominata, resultat. Nobis de priori agere sufficit cum Gal j. de art. curat. ad Glauc. cap. 10. quoniam posterioris tum natura, tum curatio, partim è præcedenti capite, partim eo, quod quartanæ inscribetur, facilis est cognitum.

Causa.

Causæ huius febris procreatrices non iniuriâ ab omnibus reputantur vtriusque humoris feracis, bilis nempe, ac pituitæ: ut sunt V. G. corporis temperamentum, ætas, anni tempus, regio, status cœli, calida sicca; vita interim ociosa, frigido & humido, vel alias immodico, cibo; potuque, utens, unde cruditates, & pituitæ abundantia.

Quæ spuria. Cæterum pituitæ aliqua do plus, aliquando

Lib. Caput xii.

40

quando minùs, sub ampla quadam latitudine, cum bile putrescit: unde fit, vt harum tertianarum spuriarum quædam propius ad exquisitæ naturam accedant, quædam longius, quædam verò quam longissimè recedant.

ria ad exquisitæ naturam propius accedat.

Longissimè recedentem, in qua pituitosus humor copiosissimus bili commiscetur, Gal. j. de art. curat. ad Glauc. cap. 8. describit, tanquam exquisitæ valde contrariam; quoniam cognitis extremis, intermediæ haud difficulter innotescunt.

Quæ longissimè, & exquisitæ tanquam contraria.

Signa.

Signa tertianæ spurix, non aliter ac materia, ipsam efficiens, confusa quoque sunt; & partim bilem, partim pituitam, denotant. Hinc rigor multò est, quam in exquisita, leuior; verùm protractior, quandoque horror tantùm inuadit; calor ad tactum remissior, ilque non ita æqualiter per totum corpus expansus.

Signa tertianæ spurix qualia

Pulsus minor, tardior, rarior, & in intervallo etiam febrile quiddam retinens, aut saltem non tam purus ac in exquisita.

Pulsus qualis.

Urina citrina, sed crassior.

Urina qualis.

Accessio à 14. horis ad 30. & 40. se extendens,

Accessio

De febribus biliosis

Quanta. tendens, quæ neq; cum vomitu, deiectione, largilive sudoribus, sed madore cutis potius, vel paucio interdum sudore, finitur.

Circuitus. Circuitum quidem & ipsa tertiana tertiana retinet; quandoq; tamen, ad tertianæ duplicis ritum, quotidie invadit.

Causæ antegressæ. Ad signa referri merentur causæ antegressæ, à quibus bilis, & phlegma, acervari potuerit, diætæ nempe, & alia; de quibus superius.

Nota in hac febri circa signa. Item, si tales febres vagantur populariter. Circa hæc porro signa in uniuersum animaduertere decet, ea aliquando exquiritæ tertianæ magis esse affinia; aliquando crudi succi plus representare.

Prognosticon.

Prognosis. Hæc febris, quantum ex se, periculo vacat; ubi autem in curando aberratum fuerit, facile in cachexiam, aut hydropem, degenerare potest.

Quam longa cōsuevit esse. Longa item consuevit esse; & quò plus pituitæ, crassioris præsertim, subest, tantò euadit longior, ita, vt quandoq; ad 12. 14. 20. 40. paroxysmos ascendat, quandoq; ad dimidium annum duret, velut ea, quæ Galieno

leno loco citato describitur. Autumno co-
pisse, atq; in Vere primū defuisse.

Longitudinem portendunt, præter Longitu-
dinem
vrinæ stabilem cruditatem, sudor frigidus
in fine accissionis prodiens, 4. Aph. 37. quæ por-
tendant.
Pulvis durus permanens; idemq; paroxy-
smi tenor perpetim obseruatus: Contra, Breuitas
breuitatem pollicetur, si non longè à prin- tem verò
cipio morbi minores, mitioresq; , fiant pa- quæ pol-
roxymis; lotium verò sedimen aliquod o- liceana
stendat; & pulvis ex duro in mollem per- tur,
mutetur.

Curatio.

Quò plus phlegmatis bili admissum est, Curatio
eò ad quotidianam febrem magis verò in quo
gens, ab exquisita tertianæ therapeia lon- cōsistit.
gius abest; è diuerso ad hanc propius accē-
dit, quò pituitæ portio minor est. Nos iux- Cura vni-
ta Gal. doctrinam curare illam docebimus, de auspi-
in qua pituita abundat: Vbi quoniam in- cūda iux-
testuna, venæq; melaraica, copia eius hu- ta Gal.
moris laborare solent, initium iunendum doctrinæ
fuerit a leni nocentis succi euacuatione:
quod autem quemur clystere, pharmaco, vel
viroq;

Clyster acrior sit oportet, quàm in ter- Clyster
tiana, ut qui componitur ex qualis es-
se debeat.

X)

De cō

De febr. biliosis

Decocto malae,

Absinthij,

Betae,

Parietariae,

Mercurialis,

Chamemeli,

Furfurum in linteo ligatorum, cum

Melle rosato,

Oleo chamemelino,

Violato, vel

communis, addita portione aliqua
hiera, & salis.

Elymas

est toto

morbi

decursu

per inter-

ualla tri-

duana vs-

tendum.

Simplicia

or & do-

mesticus

clyster ve-

parandus.

His toto morbi decursu per intervalia tri-
duana vtiliter vtemur, si alius pignior, & nau-
seabundus ad medicamenta fuerit agrotus.
Simplicior isto, atq; domesticus paratur ex

Decocto betae,

Chamemeli, in

Iure carnis; aut

Aqua cum oleo, & sale. Aut:

Decoctu herb. emoll.

Centaurei min.

Parietariae lib. j.

Sacchari rub. vnc. iij.

Olei Chamemelini,

Anethini,

Lilior. alb. an. vnc j.

Salis modicum, Melle & fiat cly-

ma.

Phar.

Lib Caput xii.

41

Pharmacia un esse queat (ægro clystima a-
uersante, præsertim, si prima corporis regio
fuerit impunita)

Pharmacia
cum qua-
le a gro
propina-
dum.

Manna,

Cassa cum specieb. hiera, aut

Electuarium de hiera, vel diaphenico.

Syrupus ros. solut. cum infus. agarici.

Syrup. diatreces,

Laxatiuus Fernelianus, &c.

Diluium rhabarbari, &

Fol. senæ,

Pil. de rhabarbaro,

de Hiera,

Puluis radicum mechoacane, cum

Specieb. aut electuario diatribuh, cum

Rhabarbaro, & iusculo quoq.

Verum hæc inter initia parcius exhi-
bentur; quoniam, vt monuimus, febris ista,
repetitis, leuioribus tamen, medicamentis,
tollitur; quibus paulatim semper aliquid
adijciendum est. Leuiorem verò purgatio-
nem, ante perfectam morbi coctionem, in-
stituere haud licet, coctionem autem vrina
monstrabit, ac tum demum cum natura vel
nullam, vel imperfectam, aliquam excreti-
onem attentabit.

Pharmacia
cis circa
initium
parcius
utendū.
Purgatio
ante pera-
fectam
conco-
ctionem.
improbata.

Vbi ventriculus, & intestina, repur-
gata quadamtenus fuerint, non repugnan-
te vel

Corpore
purgato.

cum

liqua

ati.

na.

pus.

ur ex

pod

repi

olot

ut:

mois

rouit

mon

mon

mon

mon

at cly.

Phar-

De febr. biliosis

vena se. te vel ætate, vel virtute, vena secabitur.
canda.

Prepara-
tib. ante
purgatis
onem.
utendum
quib.

Deinde, quia crassus humor citra præ-
parationem intractabilis subest, is conco-
quetur, & expulsionem ritè accommodabitur,
incidentibus, &, absq; vehementi calore,
attenuantibus, primò leuionibus, vt sunt:

Syrupus acetosus,

Oxymel simplex,

Syr. de duab. radicibus,

Mel rosarum cum aqua, aut decocto
endiuiæ, foeniculi, capillorum Veneris, agrimonie
vel:

℞. Radic. aperientium in aceto pri-
us per 24. horas infusarum, & resiccatarum
in umbra vnc. vi.

Cichorei,

Acetose,

Origani,

Betonice,

Endiuiæ, an. M. j.

Absinthij Pontici, M. s.

Sem. frigida maior. drach. vi.

Sem. anisi,

Foeniculi, ana drach. j.

Liquiritiæ rase vnc. s.

Flor. violar.

Rosarum,

Boraginis,

Genio

Lib. Caput **XII.**

42

Ceniste.

Anihos, ana. p. j. Fiat deco-

*ctio in l. q. aquæ colaturæ cum albumine
cui clarificato.*

℞. Oximell's simpl. lib. j. s.

Syrupi de duab. radic. an. vne. ij.

Misce, & f. V. doses.

*Cum per aliquot continuos dies ista
fuere exhibita, medicamentum purgans,
vnum de superioribus, aut huiusmodi
propinabitur:*

℞. Rhabarbari electi drach. ij.

*Spice scrup. s. infusorum in aq. cichor-
rij q. s.*

*Agarici in oxym. cum pauco zinzibere
infusi drach. j. Extractioni adde*

Elect. diaphœnici drach. iij. s.

Mellis ros. solut. vnc. ij. M. f. potio.

*Materia porrò febris istius ob lento-
rem suum, neq; simul concoqui, nec vacu-
ari potest, proinde repetenda sunt utriusq;
generis pharmaca.*

*Præparationis gratia superioribus ad
iungemus syropos valentiores; qualis Bizan-
tinus, & de quinq; radicibus, appellat9. Gal. loco
citato cap. 8. propinat mulsam, cui incoxe-
rint origanum, hyssopus, spice, sicut etiam utri-
usq; cremore ptisanæ piperato. Verùm id fa-*

*Pharma-
ca utrius-
que ge-
neris res
petenda.
Præpara-
tionis
gratia ad
iungens
di syrups
valenti-
ores.*

Y y 3

cit non

De febribus biliosis

cit non in omni tertiana spuria. quemadmodum rursus insinulatur ad Trallianum, sed in ea solum, quæ quàm longissimè à tertianæ exquisitæ conditionibus abest.

Vomitum
maximè
est effica-
cia.

Vomitum in hoc morbo tantæ est efficacie, vt huius solius beneficio, plurimos à febre protinus vindictos nouerit Galenus. Potest verò cieri in initio, vel infestante nausea in fine paroxyimi; aut, quod securius, & utilius est, ab assumpto cibo.

Vomitum
na.

Vomitum erit malsa in qua coctus fuerit raphanus, semen eius, aut hyssopus.

Elucen-
tibus co-
ctionis si-
gnis vri-
næ & sud-
ores e-
uocandi.

Interea elucetibus manifestæ coctionis indicijs, vrinis, & sudoribus, euocandis, obiter opera dabitur, ea ferè ratione, quam in præcedenti capite dedimus.

Quid Gal.
post 7.
propinat.

Diureticis non malè adijciuntur cicera, radices apij, petroselinum, rutæ uictorum, asparagi.

Non re-
mittente
morbo re-
perfo-
das.

Galenus post septimum, seu, quod idem est, post signa coctionis, quæ hic ante id temporis ferè nulla solent conspici, diluam absinthij valde probat.

Quinetiam nisi morbus ultro remittat, hypochondria confouere expediet per spongiam, vel linteam insuccata decocto rad. apenurium, chamæmeli, absinthij, sem. lini, & fenn. græci.

Et post

hepatu
autuq
abiuto
ceræ n
E
gerere
conuer
lini o
chino,
M
clasis
repuat
fumariæ
lactis p
cinnamo
H
dvicra
bur vil
serua r
Pontici
quotid
eci. Ro
T
D
A
alterna
exapi

Lib. Caput xii.

42

Et post somentum inunge e regionem Post for
hepatis ltu ex oleo amygdal. amararum, jucco, mentum
aut liquore filiantio enatita, ac pauxillo aceti, inungen
abiuto, cum dupla quantitate olei nardini, & da regio
ceræ modico. hepatis.

Eodem pacto ventriculi quoq; curam
gerere oportet, potestq; is fetu quoq; am
conueniente præmisso (de quo suo loco)
liniri oleo absinthiaco, de mentha, masti
chino, &c.

Medicamenta intrò sumenda huius Medica
clasis sunt recensiti syrapi; quòd si dulcia mentain
respuat æger, ei rectè præbueris dilutum terna
funarie, aut radicum cichorei decoctum in sero q.æ.
latis paratùm, ventriculi gratia nonnihil
cinnamomi, aut piperis, adijciendum.

His ita peractis, ventriculi, & hepatis, Vetricu
dvicrasia commodùm emendabitur, & ro li & he
bur vitcibus illis conciliabitur, bolo è con patis dy
serua ros. & betonice, vel conserua absinthij scrasia
Pontici, et sol. pimpinella Italica, composito, corrigē
quotidie accipiendo pro dosi vnc. l. circa da
ter. Boli vices iubeunt:

Tabella vna, aut altera, diarrhodon

Abbat.

Diatrion santalon,

Aromatic. rolat., Gabrielis. Vel
alternatim, vel mixtum, aut conserua ros.
exicipiendo: vt.

De febribus biliosis.

℞. Conseruæ ros. drach. ij.

Aromatici rosati scrup. i.

Diarrhondo Abbatis drach. s. Cum

Syrupo de corticibus citri, s. mixtura.

His substituuntur :

Trochisci de rosis,

de eupatorio,

de absinthio, an. scrup. j. In

formam pilularum redacti, saporis gratia,
superbibendo haustum aque cichorei, vel deco-
cti hordei, aut foeniculi.

Quæ ter-
tiana cir-
cuiens
prohibe-
ant.

A peculiari, & occulta proprietate, ter-
tiana circuitus prohibere creduntur illa; ve
quod celebrat Myreplus; & habet :

Succi plantaginis vnc. ij.

Aceti vini albi vnc. j. Detur calidum
duabus ante paroxysmum horis. Item huius
tertia prolatione plurimos tandem conua-
luisse vidit Alexand Benedictus :

℞ Succi polygonati,

Rad. plantag. an. vnc. j. s.

Cuscute,

Sem. sinapi albi, an. drach. j. Feruesca-
to, & colato, succo, adde sacchari q. s. est
ad edulcorandum.

Quo pertinet pulvis radicum gentiane,
aut qui efficacior est, succus earundem; vel
pulvis cardui benedicti ante accessionem albu-
ptus. Aut :

℞. Cent. minoris,

Scolopendrij, an. M. j.

Passularum,

Liquiritie, an vnc. j. Fiat decoctio in

f. q. aquæ, quantum oua ad duntiem bulli-
re solent. Colatura dulcescat sufficienti
saccharo. Capiat aliquoties die febricitatis
onis, hora vna, & altera, priusquam exacer-
batio ingruat, vnc. iij. circiter.

Ad hæc aqua stillatitia, quam Beche-
rus tertianam notat, & quartanam, haud
dubie extirpare, prodijt:

℞. Gentiane,

Cardui benedicti,

Pemhaphylli, ana M. ij. Incidantur,
& in sero lactis caprini macerentur per no-
ctem: deinde in B. M. desillentur. Da-
hulus in aurora vnc. iij. vel iij. Instante
paroxylmo itidem.

Alij hoc, ex Auicenna deprompto, v-
tuntur:

℞. vng. populei vnc. j.

Tele araneorum, à puluere mundatæ,

drach. ij. Mis. Fiant globuli, vel pa-

stilli, seu trochisci, temporibus, & carpiis
manuum, alligandi.

Vulgo caput lacertæ, linteolo inuolutum, vel
arancæ, teste nucis inclusum, è collo suspendit.

De febribus pituitosis

Victus

ratio qua
lis.

Victus ratio, attendentes causæ antecedenti, minus refrigerans hic competit, quam in tertiana exquisita, sed ad aliquam caliditatem declinare debet plus minus, pro paucitate, aut copia, phlegmatis, quod bili iungitur.

Aër cubiculi

qualis esse debet.

Cibus quibus secundum

Quanta doli edulia offerenda.

Potus

qui antequam
quies,
& qui hodie
vrsurpatur.

Die quietis

de acribus
tio con-
ducit.

Hinc aër cubiculi minus æstate refrigeretur, alijs temporibus ad temperiem declinet.

Ciborum genera, quibus licet vescuntur, in præcedenti capite recensita fuere:

ijs tamen condimenti loco piper, semina feniculi, petroselinum, hisq; affinia, rectè miscemus. Maiori etiam quantitate edulia offeremus, ob morbi longitudinē. Et quamvis Gal. alternis tantum diebus cibum præbeat, nostræ tamen regionis corpora, ob aërem, & consuetudinem, hic non tolerant.

Potus antiquitus erat aqua mulsa: nos hodie damus decoctum cinnamomi solum, vel cum radicibus cichorii: vel decoctum hordei cum pipere, vel cinnamomo, vel feniculo, vel aniso, concinnatum.

Conducunt etiam die quietis deambulationes, & corporis frictiones.

Somni mediocritas; Alius liberior; Animique quies, & alacritas, hic valde sunt necessaria.

CAPVT XIII.

De

De febribus pituitosis; ac
primum de quotidiana
continua.

DE pituitosarum febrium classe merito
primum locum occupat quotidiana
continua, velut ea, cuius fomes, pituita vi-
delicet, in maioribus vasis computrescit.

Et licet var. & sinr pituitosi humoris dif-
ferentia; nam alius dulcis, alius acidus, a-
lius salius, audit: nemq; horum alius a-
lius crassior, tenuior, viscosior, &c. depre-
hendatur: nos tamen, ut longū, ita quoq;
superuacaneū arbitramur, hæc singillatim
persequi, ac proinde, exempli loco, eam fe-
brem curare docebimus, quam dulce phle-
gma putrescens excitat; quando quidem ut
scitis a pituita salta tractanda sit, ex capite
de causo spurio propemodum liquere po-
test. in reliquis autem pituita differentiis,
quæ sæpius quoq; intermittentes, quam con-
tinuas, pariunt, id vnum ferè obseruare de-
bet, ut frigidiori calidiora, magis extenuan-
tia &c. viscosiori, quæ efficacius tum inci-
dant, tum abstergant, remedia opponatur.

Pituita igitur dulcis, si quando in ma-
ioribus vasis putret, febrem profert Auicen-

Hunc fe-
brem pi-
tuita in
maioribus vasis
putrescens ge-
nerat.
Quot
differenti-
æ pitu-
itæ.
Phlegma
dulce pu-
trescens
hanc fe-
brem ex-
citat
Acida &
salsa pitu-
ita inter-
mittentes
sæpius
quam
continua

De febribus pituitosis

as pari-
ung
Febri-
hæc Aui-
cennæ
latica di-
citur.
Curatio
huius &
hecticæ
diferes
pat.

Causæ
internæ.

Causæ
externæ.

Signa hu-
ius febris.

Calor hu-
ius febris

næ (j. quarti tract. 2. cap. 46.) eiusq; sca-
tatoribus, laticam appellatam, quia occul-
ta sit, & intus delitescat; quæq; Medicos
minus peritos, ac circumspectos, sub hec-
ticæ larua sæpenumerò decipiat, atq; in pe-
riculosum errorem præcipientes agat, cum
hecticæ curatio ab huius curatione toto
(quod aiunt) cœlo distet.

Causa.

Causæ internæ humoris pituitosi feraci-
ores sunt, temperamentum, vel totius,
vel hepatis, aut cordis frigidius, atq; humi-
dus, seu nativum sit, seu usu, aut simili ratio-
ne victus, tale efficiatur.

Externæ, crapula, ocium, balneum à
cibo, Hyems, vel alias humidus cœli status.

Signa.

Signa quotidianæ huius sunt: inuasio si-
ne horrore, rigore frigore; & quod nun-
quam ad plenam, puramq; intermissione,
aut apyrexiam, peruenit; tametsi à meridie,
& circa vesperam, nonnihil mitescit, sub
occasu tamen Solis, atq; noctem, rursus ex-
asperatur.

Calorem tactui exhibet mitem, blandū,
veluti, halituolum, qui tamen, vbi paulo
diutius

diutius contrectaueris, acrimoniæ aliquid imitit.
præferat, sed multò minùs quàm hectica. Vrina

Vrina initio est lucida, vel saltem qualis.
decolor; & nisi quid humoris simul excera-
niture, tenuis, quæ tamē, progrediente mor-
bo (si ad meliora, non deteriora, mutatio
fiat) rufedinem contrahit.

Pulsus est mollis, latus, inæqualis. Pulsus.

Aegri à calefacientibus, quàm refrige-
rantibus, melius habent.

His accedunt ea, quæ pituitæ abun- Excretæ.
dantiam in corpore arguunt, veluti, vomit-
us, & deiectiones humida, cruda, aquosa,
pituitosa. Præcordia item, ultra naturalem Præcordia
habitum, humida, & distenta. dia.

Pallor albidus. Color.

Intemperies corporis frigida, & humida. Intempe-

Aetas puerilis, vel senilis. ries.

Febres eiusmodi vulgariter grassan- Aetas.
tes; ac cætera, quæ ad causas externas re-
tulimus.

Internoscitur porrò hæc febris ab he- Quomo-
ctica, quoniam in hectica, (quemadmo- do inters-
dum suo loco fusius dicemus) calor est a- noscatu-
cer, hicq; semper à cibo exerefcit: lotium hæc fe-
sani hominis vrinæ proximum: pulsus du- bris ab
rus, & angustus: rarò per se inuadit, sed fe- hectica.
rè alias febres excipit, aut ipsdem copula-

De febribus pituitosis.

tur præcesserunt causæ calefacientes, & exsiccantes: tandem etiam leuantur à refrigerantibus, atq; humectantibus.

Prognosis.

Cum Galenus quotidianam intermittentem periculo haud vacare asseuerauerit j. de arte curat. ad Glauco. cap. 7. id multo potius de continua fuerit sententia: dum Soluitur plurimum diarrhæa, & sudoribus Subinde tamen etiam in cachexiam, & hydropem, migrare consuevit.

Curatio.

Scopi curationis sibi inuicem aduersantur. Nam febris morbus frigida humida; causa febris pituita calida, & sicca, postulat. Præpollet nihilominus quam causam huc suggerit indicatio, suadetq; , vt moderate, calefacientibus, magis quam frigoricis, utamur, cum morbus aliter, virgente scilicet, ac perseverante, quæ ipsum fouet, causa, curari nequeat. Hunc igitur cum amoliri sit animus; calidiusculis, (vt diximus) incidentibus, atq; tergentibus, rem aggredi oportebit.

Curatio.

Curatio, nisi virtus repugnet, & ætas, à venæ

Soluitura
diarrhæa.
In quos
morbos
aliquam
do mi-

grat.
Scopi cu
rationis.

Calefa-
cientibus
magis
quam fri-
goricis
utent-
dum.

à venæ sectione sumet initium, lenitâ tamen prius aluo, & absterfis intestinis, atq; ventriculo, quæ partes, sub febre ista, multo phlegmate redundare solent.

Proinde parabitur clyster ex

Clyster

Decocto herbarum emollientium; vel

ex quibus herbis parandus.

Aqua mulsæ, cum melle rosato, saccharo rub. elect. lenituo; vel

Cassia pro clysteribus, sale, oleo chamæmelino, & liliorum alborum.

Per os glutietur bolus ex cassia, & hiera; aut concinnabitur haustus cum melle, aut syrupo ros. solutiuo, manna, &c. decoctio propinanda.

Per os qualis propinanda.

℞. Aquæ mulsæ lib. j.

Mellis rosati,

Sacchari, ana vnc. j. s.

Cassie pro clysteribus drach. vi.

Olei chamæmelini,

Liliorum alb. an vnc. j.

Salis drach. j. Mis. F. clyster.

Vomitus,

Vomitus, cum nausea viget, neq; ad superiores purgationes ineptus est æger, cieri queat

Mulsæ,

Oxym. simplici, vel

Syrupo aceroso simplici,

Diluo hordei,

De.

De febribus pituitosis.

Prima
corporis
regione
sordibus
carente
vena re-
frenda-
tur.

Decoctionibus seminū raphani,
Atriplicis.

Quòd si prima corporis regio nihil istarum
sordium (sicut in nostra præsertim regione
rarissimè accidit) contineat; adeoq; depu-
ratione eiusmodi haud indigeat; ita-
tim prætermittis alijs omnibus, vena re-
frendi debet: inde ad præparandam, &
concoquendam morbi materiam accinge-
mur, ab ijs, quæ leuius, tum incidunt, tum
aperiunt, tenuant, atq; abitergunt, incipi-
entes, qualia sunt:

Oxymel simplex,

Mel rosatum simplex,

Syrupus de betonica,

de corticib. citri, cum aqua, vel

iure betonica, rad. feniculi, capill. Veneris, &c.

Vbi fe-
bris ve-
hemen-
tior, for-
tiorib9
utens
dum.

Vbi febris est vehementior, & putre-
do maior, Oxyætharam, syrupum de endiuia,
aquas refrigerantes, cichorij, endiuia, graminis,
&c. opportunè adijciemus.

In pro-
gressu
n obvi-
que ex-
hibenda.

In progressu morbi proderit exhibere

Oxymel compositum,

Syrupum de duabus

de quinq; radicibus; quorum

vicem expleuerit mulla, in qua coxerit be-
tonica, vel quid simile, ad parandam pituitæ.
idoneum; aut apozemata, cuiusmodi in præ-
sensu casu componuntur ex

Radici-

Lib. Caput xii.

49

Radicibus fœniculi,

Cichorei,

Graminis,

Chordeo integro,

Betonica,

Vuis passis,

Seminibus fœniculi,

Seminibus frig. maioribus; Sic vt co-
latur ius, & cum oui albumine decolatum,
saccharo iniecto, vel dictorum syruporum
quopiam, edulcoretur.

Elucens deinceps coctionis mani-
festioribus indicijs, à lotio petitis, plenior
purgatio instituetur; nisi natura spontino,
ac critico, alui fluxu, sudore, aut abscessu, e-
rumpente, conatum Medici salubriter præ-
uenierit. Nam quæ iudicantur, & iudicata
sunt integrè, mouere non oportet, ex do-
ctrina Hipp. j. Aph. 20. At verò cum natu-
ra vel segnius, vel prorsus non expellit, sti-
mulo habet opus, & adiumento Medici, per
Aph. 21. citatæ lectionis. Quocirca purga-
bimus

Elect. Diacatholico, cū diaphœnico, aut jndo; Quibus
vel horū alterutro cū infuso agarici in oxymelle.

Item infuso agarici, rhabarbari, fol. sene,
seminum caribami, cum cinnamomo, squinantho,
mace; in aqua betonica, sumariæ, &c. addito

A 44

syrupo

De febribus pituitosis

Syrupo ros. solutus, & elect. dictorum quopiam.

Virtute
 imbecilla semel, atq; conferunt, factam euacua-
 existente tionem perferat; apozema de materia mitio-
 quid faci rum cataracticorum parabitur, & in bus aliquot
 endum. vel continuis, vel interpollatis, propinabitur.
 inclinante. Posthæc, inclinante iam morbo, & probè
 re morbo expurgato corpore, vrinis, atq; sudoribus,
 sudores euocandis danda erit opera. Diuretica hic
 & vrinae sunt:

Diuretica

Decoctum rad. asari,

rad. aperientium;

Cicerum rubcorum;

Baccarum alkekengi;

Emulsiō 4. seminum frigida. maior.

ex aqua petroselinæ, adiecto syr. de be-

tonia.

Sudorifica

Sudorifica censentur: decoctum Guai-

fica.

acinum dilutius, aut rad. apij, ex aqu. mulo-

Totius

sa facti. Totius porro morbi decuria, ma-

morbi de

gna ratio ventriculi, aliorumq; naturalium

curfu

visceru, habenda, quoniam alioquin sub hoc

quid fac

febris tempore plurimum patiuntur: is igitur

ciendum

in instaurandis proderit

Instauranda

Conseruatio &

tantia

Flor. britonica,

partes na

Corticum citri, cum

turales,

Specieb. marroborum Abbati,

Diatri.

Lib. Caput xii.

50

Diatrion *santa' an.*
Aromatici ros. *Gabriellia.*

Foris inlingetur venter

Oleo *massichino,*

Absinthio,

Cydoniato, cum tantillo olei sil-
latij, macis, & nucis *mosehata.*

Foris in-
iungedo
venter.

Dieta eiusdem generis hic competit, quæ in intermittente, de qua mox, nisi quod tenuior esse debeat, minuiq; calefaciens.

Dieta
qualis esse
debet.

Illud inprimis sedulo efficiendum est, ut nisi alius vitro quotidie deponatur, praesertim si illa excrementa putrida natura pellere caperit, clysteribus communibus, & do-
meslicis, appellatis, subducatur.

Alius ni-
vitro
depona-
tur sub-
ducenda

C A P V T XIV.

De febre quotidiana inter-
mittente.

Q uotidiana intermittens materia non discrepat a continua; nam etiam hic pituita dulcis (de qua sola in presenti quo- que capite sermo habebitur) putredine eõ. taminata: sed solo putredinis loco, quoni- am in ista vel extra vasa, vel extra maiora saltem, pituitosus humor exardescit, quem

Intermit-
tens lo-
co non
cõtinua
discrepat

A a a 2

admo-

De febr. pituitosis

admodum supra in tertiana periodica affectu uerauimus.

Causa.

Causæ
internæ
& exter-
næ quæ.

Causas tam internas, quam externas easdem prorsus, quas continua, agnoscit; omnia uidelicet, quæ phlegmatis copiam in corpore producant, quorum iam antè meminimus.

Signa.

Signa hu-
morem
huius se-

bris pro-
dentia.

Color.

Pulsus.

Excreta.

Urina.

Somnus.

Insomnia.

Mens, &

sensus.

Iuuantia.

& læden-

tia.

Signa

hanc fe-

bram in-

dicantia.

Signa quædam humorem hunc in corpore dominantem, quædam febrem ipsam producant. Priora deserviuntur ex colore vultus, & corporis, albedo, interdum plumbeo, vel liuido; habitu pingui, & obeso; pulsu molli; excretis per os, nares, aluum, humidoribus, ac pluribus; urinâ nunc tenui, nunc crassa; somno profundo, & graui; in somnis aquæ, pluuiarum, niuium; grandinis, balnei; motu corporis segni, languido; mentis stupore; sensuum hebetudine; a iuuantibus item calidis siccis, phlegmagogis, vel pituitæ spontanea euacuatione; lædentibus vero contrariis.

Posterioris generis, quæ febrem nempe seu characterem obliquant, sunt hæc: Inuasio sine horrore, aut rigore; sed cum frigore

extremarum partium, nasi, manuum, pedumq;. Hinc sequitur calor neq; magnus, neq; statim aeris primum ad tactum, sed interiecta demum mora aliquid acrimoniae praefereus, & summè inaequalis, quasi per cribrum, aut colum (ait Gal. I. de arte curat. ad Glauc. cap. 7.) transmissus, hoc est, alicubi plenius, alicubi intercisè, minùsq; plenè, tactum feriens. Idem tardè, atq; inaequaliter per corporis ambitum leuè expandit: quoniam videtur subinde emicare, subinde rursus opprimi, haud aliter ac ignis sub virentium lignorum cumulo, velut eluctans; quod non solum sub inuasionis initium, sed reliquo etiam paroxysmi tempore, accidit, nam humor pituitosus diffusile accenditur.

Nunquam praeterea febrilis aestus eo usq; hinc exerescit, vt sitim inferat, aut agridi stragula cogat abijcere.

Adhuc, tanta in somnum ad est propensio, vt veterno subindeprehendantur.

Urina in principio morbi vniuersali tenuis, alba, aquosa, funditur: ni scilicet aliquid nocentis succi simul effluat; alioquin crassa, & turbida, apparet. In progressu declinat ad rubedinem, cum crudus pituitae succus vltiore elaboratione in sanguinem permutatur.

De febr. pituitosis

Pulsus.

Pulsus est parvus, debilis, inæqualis, initio acceſſionis, in augmento maior, vehementior, celerior: ſimpliciter tamen, ſi aliarum intermittentiũ febrium pulſibus conferatur, minimus.

Paroxysmus quātus.

Paroxysmus ad 18. horas communiter extenditur, atq; interuallum multò quàm alia intermittentes, habet impurius, minusq; integrum; adeò vt vix vnquam eos febris perfectè relinquere videatur: deſinit verò abiq; ſudore; præſertim inter initia morbi.

Reuerſio eius.

Quotidie reuertitur, idq; ſub vespérâ. Sed quoniam & duplex tertiana, & quartana triplex, pari ratione quotidie inuadunt, ad alia illarum febrium ſigna partim tradita, partim in poſterum tradenda, ni velimus decipi, confugere oportet. In quotidiana ſiquidem omnia ſigna, & ſymptomata, pituitæ, veluti in duplici tertiana bili, in triplici quartana melancholiæ, atque teſtantur.

Quomodo per paroxysmos hæc febris à duplici tertiana

Paroxysmi inſuper quotidiana omnes inter ſe ſunt ſimiles, ſecundum caloris motum, quantitatem, qualitatem, & reliqua ſymptomata: niſi quòd, more aliarum febrium intermittentiũ, aliquando (vt plerumq; apud nos) perpetuò anticipent, aliquando

Lib. Caput xii.

52

quando tardent; & quod materia morbi ad coctionem tendente, quemadmodum in ceteris quoque salubribus morbis vsuuenire assolet, de magnitudine, & vehementia, remittant.

& quarta: na triplici differat.

At in duplici tertiana (de quartana triplici idem omnino sentiendum est) euidens paroxysmorū dissimilitudo deprehenditur: ita nempe, vt paroxysmus tertius, quintus, septimus, & reliqui, diebus imparibus inuadentes, calore, aliisque symptomatibus, scilicet, vomitu, amaritudine oris, dolore capitis, &c. primo paroxysmo respondēant, quartus autem, sextus, aliisque paribus repetentes, secundum planē repræsentent.

Duplici tertianæ, & quartanæ triplicis paroxysmi inæqualis & dissimilis.

Præterea, quemadmodum in quotidiana excretionibus pituitosæ, sic in duplici tertiana biliosæ, in quartana triplici melancholicæ, deprehenduntur.

Excretiones.

Certior etiam coniectura quotidiana noscitur, si tum temporis eius generis febres populariter grassari soleant.

Item, si, quamprimum hominem febris aggreditur, præcordia fuerint distenta, inflata, & tumida.

Præcordiorum signa.

Si autē, & in ipso etiam morbo, facies albet, subliuida, aut suburgida est.

Stomach.

De febr. pituitosis

Stomachus diu imbecillis; cibi fastidium; & frequens ractus, præcesserit.

Prognosis.

Febbris hæc, Gal. affirmante, cap. 8. j. de arte curat. ad Glauco. non caret periculo, cachexia videlicet, aut hydropis, propter obstructions hepatis, & lienis, aut scirrhus eorundem.

Diuturna est, & quò sincerior, eò diuturnior; nec facile remedijs vincitur, ac sine ventriculi insigni noxa vix accidit.

Pituitæ

vomitibus

spem salutis

facit

Bene sperandum, si, inchoante paroxysmo, pituitæ vomitus ultro sequatur, & declinante copiosum fundat æger sudorem.

Si tempus interualli habet ex toto à febre liberum.

Febris

hæc rarissima

est

Quotidiana verò febris intermittens, omnium intermittantium est rarissima.

Curatio:

Scopi cui

valetis.

Copi curationis iidem profus sunt cum illis, quos in præcedenti capite quotidianæ continuæ præfiniuimus, incidere videlicet, abstergere, attenuare, & nocentem materiam quaquaversum expurgare, nisi quòd hic

Lib. Caput xiv.

53

hic validioribus, calidioribusque pharma-
cis agere licet.

Phlebotomia hic rarissime habet lo-
cum, nisi venæ fuerint crassiores, & sangui-
ne turgeant. Reliqua medendi ratio cum
illa, quam continuæ quotidianæ assigna-
uimus, ferè coincidit.

Ac pròinde initium faciemus aluum Enema
subducendo enemate ex

Decocto betæ,

Malvæ,

Mercurialis,

Chamomillæ, cum melle rosato,

ex quibz
plantis
paran-
dum.

oleo, & sale, &c. vel ex iure galli veteris, parato. Potio
Postridie portulaculam præbebimus dissolu-
to electuario diacatholico ex aq. mulsa cum mel-
le rosato soluturo, & tantillo diaphœnici: aut bo-
lum comparabimus è cassia, & hiera simplici;
vel pilulis cochis in tenui iure solutis.

qualis
et quan-
do danda
Bolus.
Pilulæ.

Inedia magno in præsentia emolu-
mento est, ac vices euacuationum subit, vices eua-
cuationum per Aphor. 62. & 63. sect. 7. & 2. Aphor. 10.

Vbi nauseabundus, & in vomitum
promptus, est ager, prætermisiss alui purgati-
onibus, per superiora pituitam educere
conabimur, eo pacto, quo in præcedenti
capite faciendum esse monstraui.

Inedia in
hac febre
vices eua-
cuationum
subit.
Vbi æger
nausea-
bundus est
per supe-
riora pi-
tuita vas-
cuanda.

Deinde alternatim coctioni phlegma-

B b b

tis cru-

De febribus pituitosis.

pituita
cruda
conco-
quenda

tis crudi, & euacuationi, opera dabitur; ita
videlicet, vt interiectis, aliquot diebus, faci-
le quiddam, & blandum, catarticum ex-
hibeamus; Crallianum sequuti lib. 12. cap.
7. qui in hoc humore manet semper parti-
ta vacuatione vii, quoniam pituita etiam
cocta crassitudinem non amittit, & ob id
forti medicamento sollicitata, laboriose e-
ducitur.

Oportet autem in presenti etiam ca-
su paulatim a leuioribus ad generaliora
tum coquentia, tum vacuantia, gradum ia-
cere.

E classe concoquentium, præter enua-
merata, collocantur:

Aqua mulsa, aut saccharata, cinnamo-
mo condita; vel

Ius pulli, decoctionis cicerum, radicum
petroselinii, hyssopi; vel

Ius apij, & cicerum, addito, aut statim
post assumptio, premissoque, sac-
charo drach. j. pondere circiter; vel

Aqua mulsa, in qua concoquetur
pulegium, betonica, thymus, hyssop-
us; vel

Semen anisi, feniculi, saccharo incrusta-
tum; aut

Confectio marthodon Abbatis.

Aroma.

Lib. Caput xiv.

54

Aromatici ros.

Efficacissima sunt:

Oxymel compos. necnon &

Syrup. de quinq; rad.

Oxym. scilliticum.

Cui porro syrups acetum recipiunt, pauxilla mastiche, atq; glycyrrhiza, castigari debent, ne ventriculū, hic alioquin noxae expositum, aliaq; partes neruolas, crebriore vlti offendant.

Purgantia conueniunt:

Polypodium,

Carthamus,

Aloe,

Turbinth,

Agaricus,

Oxym. cum agarico; cuius solius vsurpatione diurnæ febres percurantur.

Elect. Diaphœnicon,

Elect. Indum,

Pilule de agarico,

De hiera cum agarico,

Cochia;

Aggregatiue,

Aurca;

Puluis ex agarico, & zingibere; vel illo, & cinnamomo, æquis partibus: cuius tertio, aut quinto quoq; die vicino iā statū drach. j.

Bbb z

ex mel.

Con-
uentia
efficaci-
ora.

De febribus pituitosis

ex melle ros. propinari queat.

Pulvis

purgans.

Matthio-

lus quid

laudat.

Eodem pertinet pulvis ex turbit, cino-
namomo; vel mastiche, & zingibere, ac cinna-
momo vna cum turbit confectus.

Matthiolus laudat dilutum rhubarbari,

& fol. senæ.

Id verò cumprimis curandū ē, ut phar-
macis semper aliquid ventriculo familiare
adijciatur.

℞. Mellis cocti lib. j.

Aceti lib. f.

Aque font. vnc. iij.

Agarici elect. vnc. iij. coquantur ad

iustam consistentiam, expresso, & abiecto,
agarico, iterum infunde prædicto liquori
agarici leuissimi in linteo raro ligati vnc. j.
Dosis cochlearia ij circiter.

Corpore

sitè pur-

gato

quid fac-

ciendum

Corpore eiusmodi medicamentis iam
satis expurgato, rectè præbebimus hora v-
na ante febris inuasionem theriacæ veteris,
aut Mithridatij drach j. ex vino albo solutam.

Alii cochlear j. sinapi cū drach. j. & ij. mellis sim-
plicis ros. quotidie in aurora exhibent.

Secretū

quorun-

dā semen

nasturtii.

Quibusdam inter arcana reponitur in
hac, alijsq; febribus diuturnis, aq; etiam
quartanis, singulis diebus ieiuno ventricu-
lo vti seminibus nasturtij.

Experi-

menta

Quò spectant experimenta vulgaria :

vt,

vt, pulvis cardui benedicti, & gentiane.

Postquam morbus ad suum vigorem, seu statum, perductus est, conuenit vomitorium ex raphano, ellebori albi radicibus transi-

xo. Alioquin leuior vomitus, velut ex

Decocto anethi,

Chamemeli,

Atriplicis,

Sem. raphani,

Syrupo acetofo, & alijs huius farinae, etiam ante statum, & quocunq; morbi tempore vomiturit æger, cieri potest, ac plurimum conducit.

Post cibum assumptum, vel ex solo raphano irritatus vtilis est, Aëtio auctore Ter. trabibilibus. serm. j. cap. 86.

Interea ventriculo quoq; & hepati, Quibus prospiciendum est. Illi quidem: pharma-

Syrupo de mentha,

de absinthio,

Confect. diatrion pipereon,

Diagalanga,

Arom. ros. Gabr.

Extrinscus

Fomento è mentha,

Absinthio,

Mastiche,

Cinnamomo,

Bbb 3

Galan.

vulgaria.

In vigore

vomito-

rium.

oum

biop

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

De febr. pituitosis

Galanga,

Caryophyllis coctis in vino

& aqua.

Oleo al. finethiaco,

Massichino,

Nardino; vel

Solo nucis moschate stillatio,

sut per expressionem facto. Decet verò
hec ante cibum adhibere, neq; solum ven-
triculi regioni, sed etiam octauæ thoracis
vertebra, imponere.

Hepati verò robur conciliabimus :

Trochiscis de rhabbaro,

De eupatorio,

De absinthio,

Tabulis Diacurcumæ,

Dialacca &c.

Sub idem quoq; tempus, quo visceri-
bus prouidemus, elucetibus nempe con-
coctionis indicijs, diuretica, & hydrotica,
requiruntur valentiora, cuius generis cen-
sentur:

Syr. de quinq; rad.

Decoctum pulegij.

Origan.

Apij;

Ius cinnamoni.

Ancich,

Rubis

Rubie tinctorum,

Glycyrrhize,

Liquor elixari asparagi,

Fœniculi,

Beronica,

Stachados, &c.

Aër esto calidus siccus, purus, nitidus. ^{visus}
vel talis arte comparetur, excitato igne è ^{ratio}
calidis siccis plantis, lauro V. G. aut iunipe. ^{Aër.}
ro, ubi eius copia, vt in Germaniæ pluribus
locis: & suffumigationibus è styrace, belzoin,
&c ita tamen, vt caput odoris vehementia
non grauetur.

Similiter cibus ad calidum siccum de- ^{Cibus.}
uergat. Hinc conuenit caro vitulina non mu-
cosa, & hædina, quæ tamen saluta, roremaria
no petroselino, thymo, condiantur; lepusculi,
gucule montinæ, vitelli ouorum molles, pisanæ
piperata; & in prima mēla sumpta embamma-
ta è piperitide, aut radicibus petroselini tritis ^{Embama}
cum aceto, paucis amygdalis, modica crusta par- ^{mata è}
nis, & pipere, cappares ex aceto saccharato, vel ^{quibus re-}
ex aceto, & passulis, radices petroselini coctæ, ^{bus pa-}
& in modum acetarij conditæ. ^{randa.}

Primis diebus demendum est aliquid ^{Primis}
de cibi quantitate, ne cruditas ventriculi ^{diebus è}
augeatur, & pituita in venis facilius con- ^{cibo de-}
coquatur: deinde plenius alendus est eger, ^{مندم}
aliquid. ^{aliquid.}
vt lula

De febribus pituitosis

ut sufficiat postmodum rursus ad statum usque (quo tempore semper tenuissimus debet esse victus) sensim eibus detrahendus est.

Tempus
edendi.

Tempus edendi opportunum statuitur intermissio febris, quod quatuor minimum horis paroxysmum praecedat, vel si tantum spatij non conceditur, in fine saltem status.

Potus.

Bibat porro decoctum piperis, aut cinamomi, & anisi, adijciendo aliquid syrupi de quibus. rad. Concocto autem morbo, vinum tenue, & mediocriter potens, conceditur.

Somnus.

Somnum praestat esse breuem, neque ulterius protrahi, quam coctioni sit satis.

Exercitium
corporis
an
conueniat.

Exercitatio corporis, si per vires possit, ut equitatio, gestatio in curru, aut lectica, ante cibum, remissa febre, valde ex usu est; cuius vices supplent frictiones.

Aluus sit
libera.

Aluus teneatur libera chysteribus ex aqua mulsa, & sale; vel decocto betae, & mercurialis, cum melle, & sale, paratis.

Affectus
animi

Ex animi affectionibus gaudium, & moderata etiam exacerdescencia, prosunt.

CAPVT XV.

De febre Epiala,

De quos

DE quotidianarum genere, (inquit Aëtius Tetrab. 2. serm. 5. cap. 87.) est febris, quæ à leui afflictione Epiala vocatur, cum videlicet toto paroxysmo æger simul febriat, seu calet, simulq; alget, aut riget, atq; vtrumq; in omni corporis parte perlentuit.

Causa.

CAusam habet (auctore Gal. 2. de diff. febr. cap. 6.) pituitam vitream modicè, sed quibuldā duntaxat sui partibus putrescentem. Nam si maiore sui parte illa putrescat, quotidianam quidem febrem, non autem epialam, profert. Quod enim ex ea putret, calorem febrilem, quod à putredine immutata perseverat, frigus (quia pituita hæc species omnium aliarum frigidissima est) vel rigorem (si maiore impetu per partes corporis lentientes moueatur) excitare solent. Vnde si pituita hæc ampliùs putrescit, præcedit quidem rigor, aut frigus, febris sequitur : verùm hæc ipsa à caloris febrilis copia debellata, paroxysmo ad incrementum, & statum, procedente, sic oblesantur, ut non ampliùs appareat, quod tamen ab essentia epialæ est alienum.

Causæ
epialæ
pituita
vitrea.
Putrescē
pituita
calorem
febrilem,
imputris
rigorem
excitat.

Causæ externæ coincidunt cum ijs, Causæ
quæ externæ.

De febr. pituit.

que quotidiana gignunt; nisi quod quanto vitreum phlegma dulci est frigidius, tanto has illis oporteat esse validiores.

Signa, & Prognosis.

Signa item tam diagnostica, quam prognostica, cum quotidiana, iam detecta, habet communia, sed adhuc rarius occurrunt,

Curatio.

Curatio. Ceterum ne curatio multum euanuat, præterquam quod calidiora, magisque attenuantia, tum incidentia, ac detergentia, præsidia, propter extremam humoris feb. illi frigiditatem, crassitatem atque lentorem, hic usurpare expediat. Atque hoc tamen sensim, à leuioribus facto initio, deueniendum est.

Ita etiam ventriculi robur non minus diligenter seruare oportet.

CAPVT XVI.

De febre Lipyria.

Lipy.

Lipyræ vocabulo complectimur eam febrem, sub qua toto vel morbi, vel paroxylmi, decursu, interiora vehementer æstuant; externæ interim partes algent.

Hanc pleriq; auctores post epialā tractare solent, quod (vt Auic placet 4. quarti tract. 2. cap. 50.) vtraq; communem nominatur materiam, humorem nempe vitreū.

Aëtius Tetrab. citata, cap. 89. ex ignis sacri affectionibus, seu erysipelate, circa ventriculum lipyræ accendi asserit.

Illud sanè pro comperto haberi debet, in viscerum interiorum inflammationibus, seu phlegmone sint, siue erysipelata, alijsq; etiam morbis pestiferis, aut à maligna quadam materia pendentibus, frequenter extrema corporis frigere, interna vti, vt est apud Hipp. 4. Aph. 48. neq; tamen, nisi valde improprie, eiusmodi symptomata lipyræ nomine insigniri, cum etiam eorum curatio non hic inter febres, sed particulares morbos, expediri debeat.

Causa.

Causa igitur Lipyræ genuinæ est bilis flaua in penetralibus corporis, circa hepatis scilicet, mesenterium, pancreas, aut aliam partem.

Ccc 2

am pat.

Lipyræ
febris
Quid.

Materia
eius est
pituita
vitrea.

Sententia
Aëtii
de hac
febre.

Causa
lipyræ
genuinæ
in quibus

De febribus pituit.

cotinea- am partem extra vasa, vel in minoribus ca-
tur mate- rundem partium vasis, putrescens, & pitui-
ria lypri- ta vitrea imputris circa summam cutim,
am pari- seu per corporis exteriorem habitum, inna-
ens vasis. tans; vel (vt ait Actuarius 2. Meth. cap. 1.)
infarcta.

Vnde æ- Ab ile enim interiorum æstus, à pitui-
stis interi- ta verò extèrnorum perfrigeratio, pendet.

orum, & Quamuis autem Bilis etiam intra
rigor ex- vasa maiora putredinem subinde conci-
teriorum pere soseat, non putrente interim pituita,
per ambitum corporis sparsa, adeòq; conti-
nuam parere nata sit; nihilominus tamen
in præsentia de intermittente solum age-
mus; quoniam lypria continua à reliqua-
rum cholicarum continuarum therapècia
discrepantem curam non exigit.

Signa.

Signa huius febris sunt: magnus interior
Stum æstus, de quo ægri queruntur, & si-
tis inexplèta, cum extèrnorum frigore.

Prognosis.

Lypria intermittens curatu difficilis est
morbis, & inter diuturnas febres nu-
merari videtur ab Auicenna loco citato;
quoniam contrarias indicationes exhibet,
veluti

veluti consideranti planum euadit. De continua improprie sic appellata illud Hipp. in Aphor. supra citatum pronuntiatur fuit. Item quod lib. 2. Progn. tex. 4. scribitur. (Mali etiam morbi signum est, & pedes, manusq; frigidas habere, ventre & lateribus calentibus.

Curatio.

Scopi curationis eo potissimum spectare debent, ut & bilis feruor extinguatur, & rationis. illa quantocius à corpore exigatur.

Modum, ac rationem, illud exequendi in biliosarum febrium curatione primum est reperire.

Deinceps opera est danda, ut pituita, in ambitum corporis diffusa, coquatur, atq; digeratur, adhibitis frictionibus, aut inunctionibus, ex oleis, aut unguentis, calefacientibus, resoluentibus, discutientibus.

CAPUT XVII.

De febre diurna, & nocturna.

De febr. pituitosis

Diurna febris ea dicitur, quæ de die incipit, finitur noctu; nocturna contra, quæ noctu inuadit, & interdiu desinit. De utraq; loquitur Hipp. j. Epid. lect. 2, tex. 16. & Gal. in Com. ibid.

Causa.

Debetq; & hæc & illa, non secus ac quotidiana: febres, originem suam pituitæ.

Signa.

Iisdem etiam aliis indicij, quæ quotidiana nam produnt, cognoscuntur; quorum nihilominus seorsim facienda est mentio, ad morbi euentum præuidendum.

Prognosis.

Quod igitur ad prognosim attinet, et si ambæ, quotidianarum ritu, & longæ sint, & sanatu difficiles, non absq; periculo:

Nocturnam non admodum lethalem affirmat Hippocrates; verum hæc tum diuturniorem, tum maiori cum vitæ discrimine iunctam, diurnam, hoc argumentum: Cum febres pituitosæ alioquin sub noctem

primum

primum, pro motu, & natura peccantis phlegmatis, accessionem moliri soleant, hæc verò interdum inuadat; indicium sanè erit, naturam aut multitudine, aut prauitate, phlegmatis, acriter stimulari.

Accedit, quòd in febre diurna neq; opportune cibare, nec pharmaca propinare licet, nec etiam somno locus datur, quando hæc omnia in paroxysmo, vel saltem ante declinationem paroxysmi, non permittuntur; atq; is ad 18 horas, adeoq; bonam noctis partem, producit.

Delinente accessione, cibo, potus, reficiendus est æger, cui pleno dein ventriculo indormire haud expedit, verum aliquantisper à cibatione vigilare conuenit.

Quòd si medicamentum loco cibi dare constituas, etiam illud excludet somnum; ita nox ferè integra in somnis transigenda fuerit, & vix parum aliquid diei, ante febris inuasionem, quieti erit residuum.

Quocirca non immerito tales à Gal. loco citato, dicuntur vitam vespertilionum viuere.

Et ab Hippocrate in hecticam, aut tabem, migrare pronunciat, ob longiores nempe vigilas, & cibi paritatem, sub morbo adeo longo.

Cura.

In febre diurna cibare ægerum, & pharmaca propinare in eodem modo. Sumpto cibo in dormire non expedit.

De febr. pituitosis

Curatio.

Intentiones porrò, seu scopi curatiui, iidē
in præsentia occurrunt, qui in quotidiana;
na; de quibus iam satis superq; dictum est.

C A P V T XVIII.

De febribus melancholicis; & primùm de quartana continua.

Causa.

Causæ
internæ.

Causa huius febris est humor melanco-
licus, in maioribus vasis putredine con-
taminatus.

Causæ
externæ.

Externæ causæ sunt, omnia illa, quæ
de rebus non naturalibus & copiam huius
humoris parere, & putredinem conciliare,
nata iunt; quorum catalogum legere est in
Pragmaticorum commentarijs.

Signa.

Actus

Lib. Caput xliix.

61

Aestus perpetuus quidem, sed qui quarto quoque die magis exardescat, nullo rigore, frigore, aut horrore, præcedentibus.

Aestus.

Urina rubet, turbida, vel obscura est.

Urina.

Sitis autem linguæ, ac faucium siccitas, & alperitas, vigilæ, aliaque id genus accidentia, non paulo minora sunt in præsentia, quam in alijs continuis febribus esse solent.

Sitis.

Huc pertinent quæ melancholici succi redundantiam monstrant, cuius causæ effectrices præcesserunt.

Prognosis.

Morbus hic, quemadmodum rarus, ita periculi plenissimus, esse solet, aliorum more, quos atra bilis peperit, cui proinde nonnisi præmissa protestatione manus admouebitur.

Euenire etiam consuevit; quando calidioribus, & vehementioribus, medicamentis quartana intermittens ab initio perperam tractata fuit.

Cursio.

In curatione, atra bilis effervescentis refrigerationi, humectationi corporis; infusioni crassorum succorum, & virium in-

Ddd

flaura.

Acidus

De febr. melancholicis

staurationi, diligenter attendendum est.

**Enema
Phlebotomia,**

Id assequemur sequentibus. Primò lenitâ aluo ex iniecto enemate, aut assumpta castia fistula, vena (nisi quid prohibeat) sinistri brachij iecoraria secabitur.

Postea die aliquo, quem minoris afflictionis nominant, blandè quoddam medicamentum præbebitur: vt,

Medicamenta,

Diacatholicon ex sero lactis; vel
Infusum senæ, rhabarbari, passularum, glycyrrhizæ, & florum cordiati, cum modico cinnamoni, & corticum citri: aut

Medicamenta hæc sunt iteranda.

Paratum ex syrupo violaceo multiplicis infusionis, & manna, cum aq. boraginis.

Huiusmodi medicamenta, velut etiâ enemata, subinde sunt iteranda. Cum enim morbificus humor crassus sit, & contumax, ex intervallis repentâ purgationem, quam semel affatim factam, magis exigere videtur; si quidem concoctionis notæ in urinis appareant: nam alioquin irritabilis eius modi superedere præstat.

Inter vnam & alteram purgationem quid interponendum.

Inter vnâ, & alteram porrò purgationem, præparationis causa, commodum interponemus syropos ebullientes de boragine, buzlossi violacei, de corticibus, de acetositate, citri, &c.

Ex neo,

Lib. Caput xix.

62

Ex neotericis quidam defœcatum è po Neoteris
mis redolentibus succum, quem pomaceum ci quid
nominant, ad eiusmodi affectus atrabilarios interpo-
nante.
magnis celebrant encomijs.

Virium imbecillitati fulciendæ faci Virium
unt, vinum, aqua aurata (seu in qua candefa imbecilli-
ctum aurum læpius reslinxeris) opimè dilu- tatem re-
tum ; destillatum item caponum, & iulcula. stauratæ.

Præterea conserua rosarum, violarum, bo-
raginis, &c. recens, cum spec. diamargar frigi- Confer-
di, atq; pauxillo confectionis alkermes. uæ.

Huc pertinent odoramenta ex rosis, vi- Odora-
olis, styrace, moscho ; &c. & epithemata car- menta.
diaca ; de quibus in febre ardente.

Vigilia, sitis, dolor capitis, vt emen- Sympto-
danda sint, similiter ex citato capite disce mata vt
re licebit. sedanda.

Victus ratio in vniuersum ad frigidum
humidum declinare debet ; de cuius mate- Viſus
ria iam alias abundè. ratio.

C A P V T X I X.

De febre quartana inter-
mittente.

Causa.

Ddd 2

Mate

De febr. melancholicis

Intermittentis quartanae materia. **M**ateria, seu fomes, quartanae intermittentis, non differebat ab eo, qui contumaciam excitat, est autem humor melancholicus alicubi in minoribus vasculis, vel extrinsecus eadem, putredinem contrahens.

Duplex est haec febris. **H**aec febris duplex est, una legitima, altera spuria. Legitima fit à melancholia naturaliter putredine coinquinata. Ea cum veluti fœx, & limus quidam, sic sanguinis, in lienem, naturae instituto, per meientem ductus, reponitur; unde in his praesertim partibus febris quartanae legitima focus cernitur.

Spuria. Spuriam efficit adustibilis flava, nigra, vel sanguis, vel, (ut Avicennae visum est, j. quarti tract. 2. cap. 61.) etiam pituita. Tamen enim haec in verum humorem melancholicum haudquaquam transire potest, potest tamen adeo crassescere, & resicari, ut primis qualitatibus, & consistentia, melancholiam quadamtenus æmuletur, cum Galenus 13. Meth. cap. 4 crassum humorem plus minus melancholicum esse affirmaverit. Maximè cum quotidiana testetur experientia, in his subiectis Septentrioni terris, alimento multo, & crudiori, assuefactis, albos, scirrhus, elephantiasim, quos melancholiae sobolem agnoscere veteres, etiam

Quae à melancholia & pituita proveniunt vicia. am à

am à pituita provenire. Nos de legitima quartana agere constituimus, aliquid etiam de illo spurciarum genere dicturi, quod adusta bilis genuit, cum curationem, legitimæ debitam, huic applicare non liceat, nisi eam vehementer velis exasperare, (et etiâ prorsus immedicabilem efficere.

De legitima rebus agendum.

De causis legitimæ tam internis, quàm externis, nihil in præsentia, quoniam illas, quamvis minùs vehementes, communes habet cum continua.

Causæ legitimæ quartanæ.

Signa.

In vadit primo die cum exiguo rigore, vel horrore potiùs, qui tamen rigor, morbo in statam vniuersalem procedente, ad eum excresecit, & augetur, ut præ frigore, cuiusmodi sub hybernium gelu etiam lanos inuadere assolet, non solum carnes, sed ossa quoq; ipsa confringi, ac comminui, sibi ægni persuadeant, quem lentum ostocopon Græci nuncupant.

Horror.

Calor dem neq; ita multus, aut vehemens, neq; tam citò, ut in tertiana, rigorem sequitur.

Calor.

Pulsus in principio paroxysmi intrò retractus, & veluti ligatus, deprehenditur.

Pulsus.

D d d ;

non

De febr. melancholicis

non absimilis decrepiti senis pulsibus, quāvis aeger sit iuuenis. In augmento vero, & statu, velocitatem quandam, & frequentiam, acquirit, comparatione tamen ad tertianarum pulsus instituta; tardus, rarusq; est, atq; id multo magis per tempus interualli, seu quietis. Quinimo rarior hic, & tardior sit pulsus, quā in vlla alia febre, quā pro natura etiam aegrotantis.

Urina.

Urinæ pro varietate humoris, quartanam committentis, euariant. In legitima (vt inquit Gal. 2. de crif. cap. 4.) sub initium tenues, albæ, & aquosæ, sunt; in progressu rubicundiores, & crassiores, euadūt; nonnūquā obscuræ, ac nigrae, quæ, morbo declinante, salutare habentur.

Accessio
quā
producta

Accessio in 24. horas producit, & 48. horis intermittit. ita vt quartanarius circuitus duos habeat dies a febre immunes.

Paroxysmus sudore mediocri terminatur.

Paroxysmus cum sudore mediocri terminatur, non tamen id semper in principio vniuersali totius morbi accidit, nisi magna subsit plethora, & corpus alioquin ex facili ludet.

Suspicio
nē quartana quæ
augeant.

Suspicionem quartanæ augeat, si ea præcessere, quæ melancholici iucci prouentū in corpore faciunt: vt, victus melancholicus, & temperamentum non dissimile, vel solidū

solida eiusdem humoris, aut etiam sanguinis, euacuatio, vt mensium, hemorrhoidum, &c. supressa.

Morbi præcedentes febres erraticæ, obstructions, & humores lienis, qui sæpe ter huius febris, siue prodromi, siue affectæ, fieri solent.

Morbi
præce-
dentes.

Adhæc, si quartanæ populariter vagantur.

Signa porro alterius illius, quam flu-
ua bilis per adustionem parit, ista cœsunt:

Signa
Spuria.

Aggreditur hominem cum horrore,
aut rigore, non multum perseverantibus,
hæc calor multo flagrantior, & acrior, exci-
pit, quam in legitima.

Horror.
Calor.

Pulsus habet celerem; urinas bilio-
sas; paroxysmum breuiorem; biliosum vo-
mitu; sitis, atq; vigiliæ, permolesta iunt; ma-
ior corporis iactatio, & inquietudo, adest;
quin & intervallum ipsum multo impuri-
us est, adeo, vt etiam postmodum febiles reli-
quias corpus habere videatur, secus ac in le-
gitima, sub qua spatium inter vnam, & alte-
ram accessionem, medio, tum sitis abesse,
tum appetitus vrgeret, solet.

Pulsus.
Urinas,
&c.

Præcelsere item febres, alijq; morbi
biliosi, & causæ potenter calefacientes, atq;
exsiccentes, quæ scilicet non solum copio-
sam gignere bilem, sed eandem etiam adu-
tere, queunt.

Causæ
præce-
dentes.

Pro:

De febr. melancholicis

Prognosis.

Hipp. j. Epid. sect. 3. tex. 4. ait quarta-
nam omnium febrium esse securissimam, facillimam, longissimam. Eandem
quoque à magnis aliis morbis vindicare.
Quod ita accipiendū docet Galenus, tam,
si sola sit, nullumq; grauiorem visceris affectum sequatur, periculo vacare; non autē,
vbi symptomatis rationem subit, & ictericū,
vel insolubiles lienis obstructions, excipit;
quoniam, (vt idem testatur,) saepenumero
videmus, homines ex liene graui quartana
laborasse, ac deinde, collecta aqua inter cutem,
esse derunctos.

Circa
familiaris
& cui e-
xialis
esse soleat

Exitialis ferè est senibus, familiarior
30 aut circiter, annum agentibus, 3. Progn.
tex. 28. erraticas consequitur.

Autumnalis & frequentior, & productior
esse consuevit, 2. Aph. 27 3. Aph. 22.

Diuturnitas huius febris
quantum
Non excedere anni spatium inquit
Hipp. j. Epid. citato, & Auic. j. quarti tract. 2.
cap 61. nisi quid erratum fuerit.

Alias ex historiarum monumentis com-
pertum habemus, in plures etiam annos hunc
morbum prorogari.

Vulgi opinio
pauca
sa,
Quod vulgo persuasum habetur, neminem
bis quartana prehendi, experientia fallum
esse demonstrat.

Quia

Lib. Caput xix.

65

Quin & illud in confesso est, corpora post hanc febrem plerumq; habiliora fieri, & si per ætatē licet, incrementum sumere.

Viget potissimū ab anno ætatis 25. vsq; ad 45. Quod si extra hoc tempus quartana inuasit, certō tibi persuadeas, hanc febrem, nisi quid aliud hominem malē habeat, minimē diuturnam fore, ita Hipp. lib. de natura humana sub finem.

Viget ab
anno ætatis 25.
vsq; ad
45.

Curatio.

Indiget morbus iste tum calefacienti bus tum aperientibus, incidentibus, abstergentibus, euacuantibus, hac interim animaduersione adhibita, vt quocunq; medicamenti genere utaris, clementioribus ab initio utaris; ne naturæ vim inferas, febrē exasperes, ex simplici duplicem, triplicem, aut pro intermittente continuam, parias.

Quocirca pridie paroxysmi vter blā dē mollietur

Cassia cum epithymo; aut

Elect. lenitiuo; vel

Diacatholico, ex aqua boraginis, buglosæ, fæ, cuscute, &c. solutis.

Vbi mauult æger clysterem, is compa-

rabitur ex decocto herbarum emollientium, bo-

rag. buglosæ, fol. sene, addendo oleum viola-

E c

Pridie

paroxy-

smi ven-

ter molli-

endus.

Clyster

ex quib;

herbis

compa-

ccum, randus.

De febr. melancholicis

ceum, florem cassia, mel violatum, saccharum rubrum, salem, oui vitellum.

In copioso sanguine vena secanda. Si Sanguis copiosus esse videatur, vno ante accessiōem die, non tantum in principio, sed augmento etiam, morbi, vena ampliori foramine secanda erit, eaq; Basilica sinistri brachij.

Et si sanguis crassior, nigriorq; prodeat, copiose sinendus est fluere; si verò flavus, ac tenuis, statim supprimi debet.

Prodest etiam liberalior sanguinis missio ijs, qui sanguine nigro, & crasso, scatent.

Hæmorrhoidum apertio, adhibitis sanguifugis, vel, quod alijs magis placet, scalpello facta, adeo utilis est, ut vel sola morbum quandoq; soluerit. Conuenientior quoq; erit ijs, quibus mariscæ, prius fluere solitæ, iam substituere.

Huc pertinet sectio venæ manus sinistræ, quæ medium, & annularem, digitos interiacet, & in ipso interlunij puncto (nisi tempus id in paroxysmum incidat,) facta; nam sæpe præsentem opem attulit.

Satiùs verò erit, ante hanc venæ sectionem, corpus utcunq; a melancholico recremento repurgatum esse; quod nihilominus factu est opus, tametsi phlebotomia prætermittatur.

Vacua

Lib. Caput xix.

66

Vacuationem porrò leuiora præparantia anteibunt, vt sunt :

Syrupus acetosus simpl.

Præparantia.

De lupulo,

De fumaris,

De pomis,

De corticibus citri,

Mel ros. simplex, cum aq. vel iure, melissa, boraginis, buglosæ, fumaris, &c.

Neq. solum extra paroxysmum, sed in ipsa accessione, inclinante tamen, hæc prominare licebit.

Purgans conficietur è

Folijs senæ decoctis, vel infusis in sero lactis, vel

Purgantia.

Cassia, & manna resoluta decocto communi, in quo præbuerit aliquid senæ, polypodij.

Decoctum epithymi, Mesues. Item,

Cassia, & Catholicon cum lapidis lazuli preparati scrip. j. è iure borag. buglos. viol. senæ, pasularum, glycyrrhizæ, &c. indito etiam melle rosato.

Leuiora huius farinæ pharmaca in principio, & augmento, morbi, subinde iteranda sunt, ac proinde compluribus, quod sequitur, egregie proficit:

℞. Senæ orient. absq. stipit. vnc. ij.

Radicum gentianæ drach. ij.

Leuiora pharmaca in principio & augmento iteranda.

Ecc 2

tur,

De febr. melancholicis

tur, & conijciantur in vas fictile vitreatum; affusis vini albi clarissimi, atq; optimi, vnc. xxxxi. Stent per noctem in cineribus calidis. De liquore hoc excolato dantur vnc. iij. circiter, per mensem vnum, & amplius, si morbus fuerit pertinax, pridie paroxysmi quo tempore purgantia omnia securius exhibentur; etsi non desunt, qui ipso die paroxysmi talia propinare solent, arbitrati, quod res est, contumacem adeò succum, à natura iam agitari incipientem, facilius etiam medicamento vacuanti cessurum. Quam curandi rationem, ceu valde efficacem, uti penitus improbare non possumus, ita longè securiorem existimamus priorem, nisi vires robustæ sint admodum, & pharmacum tot horis ante accessionem offeratur, ut prius, quàm hæc ingruat, operationem omnem, vel maiori saltem parte, absoluat.

In morbis diuturnis quid faciendum.

Quoniam autem tam in hoc, quàm alijs diuturnis morbis, nocentem materiam paulatim tum concoquere, tum coctam educere, est necessarium; inter enumeratas iam purgationes, febre longius procedente, efficaciores etiam syropos interponere decet, cuiusmodi sunt:

Syrupus Bizantinus,
De epithymo,

Oxy.

Oxymel compositum, dilutos prius aq.
melissæ, boraginis, cuscute, lupulorum, &c. vel
decocto ceterach, tamaricis, rad. feniculi, cap-
parorum, polypodij, &c.

His ita per dies aliquot continenter Syrupis
assumptis, succedet vel dictorum pharmacorū quæ suc-
aliquod, vel Diacatholicon, Diasena Nicol. cum cedere
lapide lazuli, aut confectione Hamech acutum, debent.
& tum quidem offerre queas Cydonium, aut
pomum sub cineribus assatum, quod fibræ ellebo-
ri nigri prius transfixum fuerat, eximendo
tamen post coctionem veratri surculos. Sic
enim post sufficientem materiæ præparati-
onem, quartanariis, & alios pertinaces
morbos patientibus, hyberno tempore ex-
hibitum, breui admodum sanitatem resti-
tuere ait.

Matthioli lib. 3. epist. 12. suum quen. Ellebori-
dam elleborismum describit, quæ in Com. sing. Mat.
mentario supra Dioscoridem, tanquam re. thioli.
medium, quod vna, & altera vice, bibitum,
quartanas funditus tollat, magnis celebrat
laudibus.

Sunt qui ellebori nigri, in pollinem re. Ellebor
dacti, drach. j. s. vel drach. ij. in sapa vini niger
per noctem macerant; collato, & expresso, quomo-
adijciunt rhabarbari interioris scrup. j. dia- dō dand
grydij Gr. iij. vel iiij. quæ omnia decocto

De febr. melancholicis

passillarum, zingiberis, corticum citri, & cinnamomum, diluta, summo mane potanda præbent.

Verum huiusmodi magno cum impetu, atq; exquisitiùs, purgantia, solutis obstructionibus circa statum, & declinationem, morbi, primùm admittenda sunt. Tametsi enim eorum therapeia, qui melancholicis eiusmodi initio statim, vel multò ante vigore, vtuntur, vt stibio, vitro, præcipitato, &c. successu quandoq; haud carent, temeraria tamen est, nec facillè prudenti Medico imitanda.

Eodem tempore emeticon, è raphano ellebori albi radiculis drach. j. pondera re confixo, ac per triduum inibi relictis, parabitur: perinde verò est vel expressum postea succum, vel ipsummet raphanum, assumere.

Quomodo alii, & quomodo Gal. ellebor. propinat
Aliqui elleborum in maluatico, vel, vt Gal. solet, in oxymelle, vnius noctis spatio infundunt, eiusq; dilutum propinant, quo medicamento, paucis præsertim diebus intercedentibus, repetito, & hunc, & similes insuperabiles ferè morbos, aboleri tradit Petrus Sarius diuersis lib. de affectionibus particularibus cap. 9.

Eundem effectum præstat oxymel elleboratum Geineri.

Cæc.

Libr. Caput xix.

68

Cæterum & Hipp. ipse 4. Aph. 13. & Aëtius Tetrab. j. ferm. 3. cap. 120. & sequē-
tibus aliquot, multis ante ellebori vsum
præparationibus, & cautionibus, opus esse
tradit, ne lethalis conuulsio, vt habetur 5.
Aph. j. sequatur.

Nicol. Florentinus vomitorium quod Nicol.
dam suum è radice palme Christi, pollicis ma- Flor. vo-
gnitudine, bene pista, generoso quoddam vino miteriū
delibuta, paratum, bis terūe, prægressis va- forte.
cuationibus aliis, propinatū, sum omperere ex-
tollit. Verū circa valida hæc in vniuer-
sum scire conuenit, iis, qui ad vomitum in-
epti, nec nauseabundi sunt, & vel aliās de-
biles, & emaciatī, apparent, haudquaquam
elleborum, aut palmam Christi, exhibenda. Leuiora

Leuiora vomitoria cætera, ex decocto, vomito-
succoq; raphani, aqua mulsā, oxymelle, &c. ria abe-
confecta, quouis morbi tempore, abeunte ante pa-
paroxysmo, antè, vel assumpto iam cibo, roxyfmo
locum habent; nisi fortè, veluti monuimus, quouis
ad vomendum omnino ineptus sit æger; morbi
quo casu Hipp. (4. Aph. 9) melancholi locum
cos plenius per inferiora purgare iubet. habent.

Postridie purgationis fortioris vtiliter Postridie
hauriet theriacæ veteris drach. s. aut drach. j. purgati-
vino generoso, aut aromatico, distemperata; onis for-
quæ cæteris etiam diebus, concocta morbi tioris
mater menduci quid sit.

Cate-

De febr. melancholicis

materia, salubriter datur.

Modus &
tempus
theriacæ
exhiben-
dæ.

Modum porrò, tempusq; vtiliter ad-
ministrandi theriacam, Gal sub finem ca-
pitis 15. libelli de theriaca ad Pisonem, pul-
chrè perstringit his verbis: Ego namq; mul-
tos quartana laborantes, hac ingressus artis semi-
ta, facile à morbo vindicaui. Primum enim, cum
coenassent, ut euomerent effeci: deinde secuta die
sucum absinthij bibendum tradidj, quo bilem
contemperarem, ac velut edulcorarem. Postremò,
duabus horis ante inuasionem, antidotum exhibui:
atq; ita cum omni admiratione voti compos euasi;
cum celeriter is, qui theriacam assumpserat, liber
ab inuasionem maneret. Hactenus Gal.

Circa sta-
tum mor-
bi vniuer-
salē quæ
expediât.

Eodem tempore circa statum morbi,
videlicet vniuersalem, expediunt & reliqua
calidiora:

Diatrion pipereon,

Diasspoliticum,

Aromat. caryophyl. ex vino forti,

Aurea Alexandrina,

Puluis, aut infus. caryoph. ex aq. vitæ,
vel is ipse puluis, cum cinnamomo, & pipere è
generoso quopiam vino, datus.

Et, quod Gal. libello de rigore & pal-
pit. cap. 7. sibi probatissimum nominat, è
succo Cyrenaico, pipere, myrrha, vel ex hoc, & ca-
storeo, atq; alia huius geueris plura passim
apud

apud Medicos nota: neq; enim hæc febris, nisi corpus eximiè incalescat, vlllo pacto curabilis, quod non ignorauit Arist. j. Problem. 58. qui quartanariis tali victu, & medicamentorum genere, multum velut ignē in corpore accendendum esse asserunt; quæ tamen parciùs calidis siccis naturis, & æstuoso cæli statu, vsurpari debet.

Neq; illud prætereundum, quod Cordoni vomitio. donius monet, statum, seu vigorem, huius febris, in quo calidioribus hisce locus est, non ex vrinis solùm, sed etiam paroxysmorum tum breuitate, tum symptomatum mitigatione, esse metiendum; quoniam homo parcus cibi, beneq; dormiens, vel in quartanæ principio vrinas concoctas mieri potest, non ob materiam morbi, sed ob cibum ritè elaboratum.

Præterea euocandis sudoribus, & vrinis, sub statum commodè opera dabitur. Sudores Prioris ordinis habentur, præter theriacam, quæ euocant. & mithridatium,

Mulsa, in qua præbullierit calamentum, anethum, aut ruta.

Decoctum item guaiacinum, & myrrha cl. drach. j ex Maluatico calente hora vna ante paroxysmum, ægro vestibis vndiq; cooperato, propinata: quæ potio ter, eo, quo dictum, Fff modo,

De febr. melancholicis

modo, repetita, liberat à febre, vt Matthio-
lus refert.

Vrinæ
scientia.

Ad eandem intentionem commendat
radicem angelicæ ex hordei decoctio absorptam.
In diuretica locantur:

Oxymel, syr. de quinq; radic. de hyssopo, &c.

Quò spectant recentiorum *salia* è *stir-
pium cinere* parata: vt, *sal polypodij, chama-
dryos, fraxini, ceterach, tribus, quatuorue granis,*
ex aqua conuenienti, cuscute V. G. borraginis,
&c. data: quæ magnæ sunt energię, si hoc
*tempore, hoc est, circa statum, exhibean-
tur, non autem prius, quàm notæ coctionis*
manifestissimè conspiciantur.

Experi-
menta
quartanæ
abigen-
tia 12.

Experimenta, quibus quartanarius cir-
cuitus certò abigi credatur, sunt varia apud
varios. Cordonius *succum calamenthi* dat ante
paroxysmum.

1.

Item *verbene* (*femine* scilicet, ita Mat-
thiolus) *expressus liquor, & vini albi odorati,*
ana vnc. ij. tertium iterata potione, cuius in
seipso, & alijs, periculum fecisse gloriatur
Arnoldus de Villa noua.

3.

Adhæc *drach. j. radice asari in poslinem*
trite, imminente iam accensione ex Malua-
tico, imperato postmodum sudore; quod
semel, atq; iterum quoq; faciendum fuerit.

Theriaca

Lib. Caput xiv.

Theriacam veterem cum aliquot guttis
olei vitrioli eodem pacto præbent nonnulli.

Alij cortices aurantiorum ex absinthiaco
offerunt, cum accessio iam iam in metu est.

Sunt, qui arcano hoc antidoto tenaces
quartanæ vires se infringere gloriantur :

℞. Olei vitrioli ritè apparati guttas viij.

Syr. de cichorio simpl. vnc. j.

de absinthio vnc. ij. s. Misc.

Alexander Benedictus puluerem folliculorum
senæ ex vnc. iij. decocti absinthij alternatim
per aliquot dies offert; simulq; dorsi spi-
nam laurino perungit oleo.

Panis secalinus furno exemptus in aceto
maceratur, & destillatur, cuius liquoris, in-
stante paroxysmo, datur vnc. s. circiter.

Nec desunt, qui dieb; xvi. cōtinēter dāt suc-
ci borraginis depurati drach. iij. è vino Cretico.

Præterea gentiane succus (modo à Diosco-
ride lib. 3. cap. 3. tradito paratus) castanæ
autē glandis magnitudine, ingruente iam
paroxysmo, bis datus, quartanam omnem,
etsi grauissimam, sustulit; sed & in alijs qui
buscunq; diuturnioribus febribus magno
solet esse vsui.

Quò spectat Gesneri, lib. ad parabilia
Dioscoridis, antidotus, Saxonica nominata.

Nec continendus est pulvis, qui se-
quitur :

Fff 2

℞ Rad.

70

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

De febr. melancholicis

Rad. gentiane drach. iij.
 Calami aromatici,
 Baccar. lauri, an. scrup. iij.
 Spec. diatrion. pipercon. scrup. iij. f.
 Sileris montani scrup. ij.
 Rad. filicis scrup. V.
 Rad. asari scrup. ij. f. Misc. Vlus
 eius est præmissis conuenientibus purgati-
 onibus ex diasena, vel paris efficacia me-
 lanagogo drach. j. pōdere ex aq. borrag. V.
 G. aut vino generoso, instante accessione,
 & ad sudandum disponente se ægro, datus.

Animi
 affectus in
 hac febre
 multum
 præstant.

Multum præterea in hoc genere præstant
 affectus animi vehementiores, ingens lætitia, ira,
 maximè verò timor, vt quandoq; visi sint
 quartanam finiuisse. Hinc Rhases ægrum
 stricto gladio inuadere, & edentulos serpentes in
 eum conijcere, docet.

Ebrietas
 & inglu-
 uies sub-
 inde hanc
 febrim
 persanāt
 Peria præ
 externa,

Quinetiam ebrietas, ac varij cibi, potusq;
 licet prauis, magna auuiditate, & ingluuie, ingur-
 gitata, hanc febrim subinde persanarunt.
 Causam vide apud Brudum Lusitanum lib.
 3. de vict. febr. cap. 18.

Periapta ab auctoribus huc facientia
 describuntur. Ita apud Diosc. vermiculi in ea-
 chino dipsaci reperti, & araneus alute inclusus,
 de collo, aut brachio, suspensus, quartanæ
 circuitus prohibere dicitur, aliaq; huius classis

com.

complura: quæ si quas vires possident, certè ijs, non nisi therapeia legitima præeunte, vitimur vtiliter.

Interim magna semper in hoc morbo viscerum habenda est ratio, cordis præsertim, ac lienis, sinè cuius vel dyscrasia, vel pertinaci obstructione, aut humore, quartana nunquam potest esse diuturna.

Cordi præclarè fuerit prospectum, intus dando confectionem diambre, diamoschi dulcis; foris epithemate parato ex aq. borrag. ros. melisse, spec. cordialib. croco, zedoaria, aceto, vino aromatico, &c.

Ventriculum, & hepar, ijs ferè præstidijs tuebimur, quæ in curatione quotidiana propoluimus.

Lienis obstructiones expediunt decoctum corticum radicum capparis, tamaracis, ceterach, absinthij Pontici, chamedryos, adiecto oxymelle, quod vicem syrupi præstabit: vel exhibito pulvere ceterach, & radicum filicis, cum vino. Exteriùs sinistrum hypochondrium fouebitur per spongiam imbutam decoctione rad. althæe, capparis, fraxini, sem. lini, sanugræci, perfulis aceto, & aqua; ablata spongia, locus oblinetur amygdalarum amar. oleo, de capparibus, de spica, cum succo cyclaminis, ammoniaco ex aceto soluto, ceraq. modica, in formâ vnguenti redactis.

Fff 3

Vbi

Cordis & lienis in hac febre magna ratio habenda.

Lienis obstructiones expediunt

De febr. melancholicis

Vbi scirrhus aliquis magis rebellis deprehenditur, qui curationi quartanæ remorari faciat, is profligabitur eo modo, quem suo loco diximus.

Symptomatum omnium quartanæ rigor molestissimus. Rigorem mitigantia.

Inter quartanæ symptomata rigor omnium solet esse molestissimus; qui mitigatur, vbi pannis calentibus extrema foveantur, vel manus, pedesq; calenti aquæ immergantur, aut æger tempestiuè in molli lecto, ante paroxysmi aduentum, bene contestus collocatur, calidiq; lateres vino quopiam aromatico aspersi, linteis inuoluti, pedum plantis, volis manuum, applicati, remouendi mox, cum calor febrilis eruperit.

Vnctio spinæ dorsæ.

Commoda item erit vnctio spinæ dorsæ si hora vna, vel duabus, ante paroxysmum, impositis dein pannis calefactis, rectoq; diligenter ægri corpore.

Litus 4.
1.

℞. Succi rutæ,
Vini Maluat. an. ꝑnc. ij.
Olei scorp. ꝑnc. iij.

Aq. vitæ ꝑnc. j. Coquantur, lege artis, ad succi consumptionem, Fiat linimentum.

2.

Aut quod Vicius deprædicat:

℞. Saluæ,
Rutæ,
Absinthij,

Rori-

Lib. Caput xix.

72

Rorismarini, an. M. s.

Massiches,

Olibani, an. drach. j.

Coquantur

in vini Maluat. & olei oliu. an. cyatho vno,
donec liquor absumatur. Fiat valida expres-
sio; & vtere. Vel:

℞. Aq. vite vnc. s.

Theriace el. vnc. j.

3.

Olei laurini vnc. s. Misce. Vel:

℞. Olei laurini,

4.

Olei ranarum, an. vnc. iij.

Spirit. vini lib. s.

Lumbric. terre num. ix. Bulliant
omnia simul ad spiritus vini consumptio-
nem; coletur.

Trallianus ante paroxysmum, corpo-
re tamen prius bene purgato, multum tri-
buit calidis epithematis,

Trallianus
calidioribus vti-
tur epi-
thematis

Per os exhibetur, ante febris inuasio-
nem, ubi refrigeratio tam magna est,

Per os
que exi-
beantur.

Piperis drach. j. ex aq. ardente;

Vinum aromaticum calens. Vel

℞. Aq. vite vnc. j.

Pulu. caryophyl. scrup. s. Misce.

Frigida nimis, siccantia, viscosa, flatulenta, Victus
crassa, prius deuitare oportet. ratio.

Aerigitur ad calidum, & humidum, de-
clinet. Aer.

De

De febr. melancholicis

Ciborum
prohibi-
torum ca-
telegus.

De *cibis* obest panis secalinus, malè fermentatus, & pistus: caro bubula, taurina, leporina, ceruina, suilla; carnes sale, aut fumo, induratæ; sanguis animalium, indeq; confecta lagana, seu farcimina, aues quæ in paludibus degunt: vt, anseres, anates, &c; pisces grandiores, dura, & glutinosa, carne præditi; caseus vetus; bralsica, leguirina; de fructibus mespila, sorba, cydonia, & alij fructus adstringentes.

Cibi qui
conce-
duntur.

Aquæ potus, veluti lienì peculiariter noxijs, prohibetur.

Horum loco conceduntur, quæ sanguinem tenuem, atq; clarum, gignunt. Ex carnibus hædina, agnina, vitulina, veruecina; pulli, capones, auiculæ nemorales; pisces etiam teneri, nequaquam glutinosi succi: vt, funduli, lucij, percæ; cappares, velut & cætera salsamenta è lepidio, & sinapi, parata, condimenti more, non alimenti copia, edantur.

Acetum
obest.

Acetum obest; nisi febris à lienis quodpiam affectu soueatur.

Potus.

Potabulum vinum album, tenue, mediocriter calidum: aut eius loco, decoctum piperis, aut cinnamomi; vel huius, & galangæ.

Somnus.

Somnus esto mediocris, velut etiam exerci-

exerci
inhibi
proli

gato
cedi
supp

facie
mata

seria
proc

ctati
fica,
temp
vt di
rana

ILLI
fi
dica
Alex

lien

exercitia consueta diebus interualli haud
inhibentur, si paroxysmi neq; violenti, neq;
prolixi, sint nimium

Balneum aq. dulcis sub tepidum, pur- Balneum
gato iâ corpore, ac morbo inclinante, con- aq. dul-
ceditur; cuius vicem alioquin frictiones cis,
supplebunt.

Aluus aperta retineatur, vel cibis huc Aluus.
facientibus; vel enematis; quorum paradig-
mata ex superioribus repetere licet.

Curæ, sollicitudo, rerum grauiorum Animi af-
seria paulò magis studia, tristitia, mæror, fœdus,
procul hinc exulent.

His succedant hilaritas, & animi oble-
ctatio, ex amicorū confabulationibus, mu-
sica, &c. Metus nihilominus, atq; iracundia,
tempestiuè, & loco suo, excitata, interdum,
vt diximus, commodant. Hactenus de quare-
tana ex melancholia naturali pendente.

Curatio spuria.

Illi, quæ ex vitione fœcis sanguineæ, aut
flauæ bilis, oritur, tertianæ legitimæ me-
dicationem ritè applicabimus, ita suadente
Alex. Tralliano.

Ac proinde maioribi hepatis, quàm Hic hepa-
lienis, habebitur ratio; atq; operæ præciū erit tis maior
cholæ

De febr. melancholicis

quàm li- cholagogis suprà memoratis aliquid adijce-
enis ha- re, quod adustos humores vacuare sit na-
benda ra- tum, vt est:

tio.

Confectio Hamech,

Pil. Inde,

Pil. de fumaria.

Quando
in hac
febre
theriaca
danda.

Theriacam porrò non dabimus ante-
quàm morbus planissima coctionis indicia
proferat, tumq; eam parciore manu, saccharo
rosaceo, vel alio quopiam eius generis, car-
diaco correctam, dabimus.

C A P V T XX.

De quintanis, sextanis, ali-
jsq; longioris interualli,
febribus.

Andene-
tur quin-
tanæ, sex-
tanæ &c.
dubitant
auctores.

Dubitant auctores (inter quos Galenus,
Campenius, Valesius) vtrum quinta-
nus, septimanus, nonanus, typus, de quibus
Hipp. j. Epid. sect. tex. 2. & 9. peculiare ge-
nus febrium constituent, an recidiuæ quæ-
dam censi debeant. Verùm non desunt
magni Medici, qui id genus periodos ob-
seruârunt. Auicenna j. quarti tract. 2. cap.
67. & Arculanus quintanam, Thomas a
Vei. Com. in 2. de diff. febr. sect. 4. septi-
manam,

manam, & nonanam; Petr. Salius octaua-
nam, & historiam duplicem huius febris
recenset; Gentilis vidit febrem, quæ 15.
quoq; dit, & quæ semel tantum in anno, e-
xacerbabatur. Quemadmodum etiam de
Antipatro Sidonio referunt Valerius Max.
lib. 1. cap. ult. & Plin. lib. 7. cap. 51. cum
omnibus annis vno tantum die natali febris
citare solitum, & ea febre consumptum esse
fatis longa senecta.

Causa.

Causam istarum febrium pleriq; tribu-
unt pituitæ paucæ, & admodum cras-
sa, quæq; naturâ melancholiæ æmuletur.

Signa.

Cognoscetur ex ipso circuitu facillimè.

Prognosis, & curatio.

Prognosis autem, & curatione, à quar-
tana mutuabitur, illa potissimum quæ
apud Arabes phlegmatis perhibetur esse
foboles. Procedet autem cum illis, quæ
corpus vomitu, & deiectione, à superfluis
liberant, aliisq; tam medicamentis, quam

Progno-
sis & cur-
ratio à
quartana
petenda.

De febr. melancholicis

alimentis, quæ vim tenuandi, incidendi, abstergendiq, possident.

Quò pertinent, theriaca, & aromatica confectiones: vt diarrhod. arom. ros. Gabrielis, &c.

Thom. à
Ve. quam
causam
harum
februm
statuat.

Cæterùm Thom. à Vei. loco citato, harum februm causam non tam succo melancholico, aut alteri cuiusq, crassitie, & paucitate, illam referenti, adscribendum putat, quàm ipsimet naturæ, quæ per certa intervalla, prout lacescit, vitiosum humorẽ, in corpore latentem, aggreditur, quicunq, tandem is fuerit: ac præterea censet eiusmodi periodos rationibus, & his quæ præter communem cursum, ceu monstri similia, conueniunt, computandas.

Quisquis igitur propriissima harum februm indicia nosse desiderat, is notas humorum variorum, in corpore excedentium, diligenter consideret; ac deinde pro modo nocentis succi, debita prouideat remedia.

CAP V T XXI.

De febribus compositis.

Febres
variis mo
dis com
ponuntur.

Absolutis ijs, quæ de simplicibus febribus dicenda videbantur, doctrinæ ordo exigit, vt de compositis quoq, paucula in medium adducamus.

Cons

Constat sanè febres multis modis com-
poni, veluti præclare Thomas à Vei. Com.
in 2. de diff. febr. sect. 5. parag. Putrescen-
te pituita. Vel enim alijs diuersi generis mor-
bis copulantur, inflammationib9 V. G. inter-
nis, cuiusmodi sunt, quæ pleuritidem, hepati-
dè, splenitidem, sequuntur; aut quæ viscerū
erysipelata excipiunt: vt lipyria, typhodes,
chynodes, ex erysipelate ventriculi, iecoris,
pulmonis.

Vel talibus iunguntur accidentibus, Inter
quæ totam Medici industriam ad se trahunt,
quales habentur syncopales appellatæ. dum fe-
bres sibi

Quandoq; sibi inuicem complicantur, inuicem
vel eiudem, vel diuersi, generis, aut speciei,
febres: vt, hectica cum putrida; quotidiana
cum tertiana; tertiana, & tertiana, ita vt du-
plicentur, &c. quarum coniugationum dif-
ferentias singulas scripto complecti, vt infi-
niti, ita propemodum superuacanei foret la-
boris. Nam qui simplicium febrium natu-
ram, causas, & curationem, habet perspectā,
is compositas quoq; sanandi methodum se-
nouisse poterit affirmare. Neq; enim aliter
febrium compositarum signa, & indicatio-
nes, permiscetur, quàm pro ratione causa-
rum, signorumq; componentium.

Sic enim vbi vna febris in illa compli-
catione tollere.

Lib. Caput xxii.

catione alteri præpollet, prævalenti plus o-
peræ impendim9, non neglecta penitus co-
plice.

Prævalen- Si pari passu ambulant, & veluti pror-
ti febril- sus sunt æquales, æqualem vtriq; curam
plus ope- præstamus.

Ex compositis igitur febribus, solum
hemitritæum, tanquā notissimum, exempli
loco, tractabimus. Febres enim, quæ inter-
narum inflammationum, & erysipelatum,
curantur sunt comites, non curantur, nisi morbis illis
vnde pendunt, abintis.

Syncopales vero febres cum Gal. lib.
iz. luculenter admodum, ac perspicue, sic
prosequutus, operæ precium non est, ut vel
a nobis aliquid adijciatur, vel Galeni verba
huc transcribantur.

CAPUT XXII.

De hemitritæo, aut semitertiana.

Galenii
hemitritæ
acce-
ptiones
varia.

GAL. in libello de typis cap. 4. varias he-
mitritæj acceptiones memorat. Ali-
quando enim semitertianā generatim no-
minat omnem febrem compositam ex quo-
tidiana & tertiana, siue continuæ sint, seu
intermit-

inter-
prop

tritæ
nam

scella

possi

tiana

tertia

lata;

nem

co ci

more

verò

latis,

tex. 2.

descri

tinua

re for

Aph.

sanè r

a Ve

Nam

tæus,

comit

ctibus

affirm

intermittentes: aliquando, & magis quidem
proprie, eam continuis annumerat.

Cum autem ad continuitatem hemi- Proprior
hemitritæ
accet-
prio.
tritæ efficiendam alterutram (quotidiana
nam dico, aut tertianam, è quarum ille mi-
scella resultat) continuam esse oporteat;
possitq; vel quotidiana continua cum ter-
tiana intermittente coalescere, vel contra,
tertiana continua cum quotidiana interpo-
lata; Galenus priorem febri in copulatio-
nem pro legitimo hemitritæ agnouit lo-
co citato, quæ scilicet ortum ducat ab hu-
more pituitoso in maioribus vasīs, bilioso
verò in minoribus, & à corde longius dis-
satis, putrescente.

Cæterum Hippocrates j. Epid. sect. 3. Hemitri-
tex. 2. hemitritæ nomine non tam febri thæ9 Hip-
pocratia
cus.
descriptam, quàm tertianam omnem con-
tinuam, tertio quoq; die cum aliquo horro-
re fortiorem fieri solitam, de qua etiam 4.
Aph. 43. intelligere videtur, quod validis
sanè rationum momentis confirmat Thom.
à Veiga loco citato parag. Sed quoniam, &c.
Nam, experientia attestante, talis hemitri-
tæus, non autem Galenicus, prope mortem
comitatur tabidos, & alios è chronicis affe-
ctibus pereuntes, quod de suo hemitritæo
affirmat Hipp. loco citato, quemadmo-
dum

Hemitritæ
ta9 Hipp.
prope
mortem
comitatur.

De febr. melancholicis

Opinio
vulgi Me-
dicorum.

dum plurimi, citra alium morbum, è sola tertiana continua, quæ tertio semper die horrorem exiguum excitet, moriuntur, quos vulgus Medicorum mori arbitratur è tertiana notha subintrante, hoc est, cuius alter paroxysmus incipiat, priore nondum finito. Atq; hæc ab Hipp. mortalissima censetur; quoniam horror ille significat naturam quidem in singulis accessionibus conari bilem, cuius malitiâ irritatur, è vasis in ambitum corporis propellere; verum in medijs conatibus deficere, id quod febris continuas perseverans ostendit, atq; hoc pessimum est omen per Aph. 46. sect. 4.

Huius & signa, & curatio eadem est quæ tertianæ continuæ, inter simplicium febrium differentias descriptæ.

Signa.

Signa &
curatio
Gal Hemi-
tritæi.

Signa porro Galenici hemitritæi sunt: febris cum horrore non solum inuadens, sed in bonam paroxysmi partem producta, qui horror quamvis remittat, paulò post, ceu noua ingruente accessione, recurrit, (Galenus reduplicationem hunc recursum horroris indigitat) propter illam videlicet quasi luctam humorum contrariorum bilis tenuis,

tenuis, & pituitæ tenacis, quæ impedit, atq; retardat, exclusionem bilis, unde resistat subinde, prodit tamen sudor, aut bilis vomitu, vel secessu, ferme rejicitur alterius solùm diebus, & maximè cum tertiani paroxysmi insultus cum quotidiana continuæ exacerbatione coincidit. Diebus enim paribus, secundo, quarto, sexto, &c. quando sola quotidiana ægrum exercet, nihil istorum accidit, cæteraq; symptomata sunt remissiora.

Prognosis.

Morbus iste olim Romæ frequens, hodie rariore est, longus alioquin, difficilis, & valde periculosus, nervosas partes, potissimum autem ventriculum offendit, multaq; alia incommoda secum trahit.

Curatio.

F'Ebris hæc, quemadmodum è complexu quotidianæ & tertianæ provenit, ita etiam multis earum auxiliis tractanda venit; id verò cum primis discernendum, uter humor pituitosusne, an biliosus alterum excedat. Nam si bilis copiosior erit, tertianæ dicatis remediis contra morbum pugnabimus;

H h h

si pituita

De febr. melancholicis

pituita vincat, his, quæ in quotidiana recensuimus, liberalius ytemur. Verbo dicā: vniuersa curatio à tertianæ spuriae therapeia parum discrepat.

Cura à
clysterio
in initio
prespicienda.

Remedia igitur erunt in initio lene clysterium, aut ecceprocticon aliquod blande: deinde phlebotomia; postea syripi, aut apozemata, quæ tum bilem attemperant, tum pituitā apparant, vti sunt:

Syrupus de duab. rad.

Bizantinus,

De hyssopo,

Oxym. comp.

Syrupus acetosus,

De cicchorio cum rhab.

De acetos. citri. &c.

Post notas coctionis conspicuas, dilutum, vel decoctum, absinthij Pontici, rectè præbebitur; deinceps purgantia conueniunt,

Rhabarbarum V. G. cum agar,

Elect. diaphænicon,

De psyllio,

Diatur biib, cum rhab. & rad. mechoaca puluerata.

Ad extremum viscera coctioni seruientia roboranda

Trochiscis de rhab,

De aba

Lib. Caput xxii.

72

De absinthio,

Diarrhedon Abbatis,

Diatrion santalon, addendo duplum,
triplumue, rhabarbari.

Ratio victus eodem spectare debet, victus
quò pharmaca cætera, nempe, vt aer sit, ratio.
temperatus, cibi facilis concoctionis, & vi refri-
gerandi, atq; abstergerendi, præditi, qualis est pit-
jana, aliq; ex hordeo parata edulia.

Potus esto:

Potus.

Decoctum hordei,

Glycyrrhizæ,

Pasularum,

Sem. anis. &

Cinnam. Hæc

verò ipsa nequaquam offerri debent, nisi
in vera febris remissione, & vbi ea venit,
protinus danda sunt.

Monet deniq; Cern. Cels. lib. 3. cap. 8.
intempestiua cibatione plurimos in hoc
morbi genere pessundari.

Somnus, vigilæ, exercitationes cor-
poris, vbi per vires licet, animi pathema-
ta, omnia ad moderationem spectare de-
bent.

Quintus Serenus cæteris periaptis hanc Periapta.
præfert schedam, collo appeniam, in qua
scriptum sit verbum:

H h h 2

Abra-

De abs

De febr. melancholicis

Abracadabra,

Abracadabr,

Abracadab,

Abracada,

Abracad,

Abraca,

Abrac,

Abra,

Abr,

Ab,

A.

Hactenus in vniuersum de febribus humoralibus.

C A P V T XXIII.

De febre hectica.

Hectica
febris
quid.

HECTICA febris tum dicitur, cum calor præter naturam in solida cordis substantia accenditur; constituitq; tertium, & summum, febriū genus; de quo (expeditis iam duobus alijs, quorū vnum in spiritibus cordis, alterum in eiusdem humoribus calefactis, versatur) in præsentia nobis agendum restat.

Est autem solidæ substantiæ non vna, & simplex, significatio. Quandoq; enim per solidum, latè loquendo, intelligimus, quicquid

quid à spiritu, & humore, seiunctum in partibus corporis numeratur: ita caro simul & adeps appellantur solida: aliquando ac propria, veluti etiam hoc loco, per solidas partes spermaticas oportet inaudire. Sic Thom. à Vel. Com. in j. de diff. febr. cap. 8. sect. 4. parag. Generantur igitur. &c.

Calor is in cordis substantia defixus, humiditatem in solidis subsistentem, calq; proximè nutrientem (Gal. 7. Meth. cap. 6. rorè appellat) vel tantum accendit, & ebullire facit; vel insuper depascit, atq; imminuit; vel iam omnem consumpsit, vt nihil eius superfit amplius. Vnde tres hecticae veluti gradus, aut differentiae, resultant. Prima simplex nominatur hectica; postrema torrida; seu, consummata; secunda medio inter vtramq; collocatur loco, & magnam patitur latitudinem pro maiori vel minori humiditatis illius consumptione.

Hecticae
differentiae seu
gradus.

Causa.

Febri hectica vix vnquā hominem primò, ac per se, inuadit, agnoscitq; causas impensè calefacientes, & exsiccantes, ac subiectum valde ad id dispositum; ferèq; se-

H h h 3

per

De febre hectica

per excipit vel diarias, ex ira, mærore, inedia, diutius perseverantibus, vel putridas & ardentes, præposterè curatas; vel internorum viscerum calidam siccamq; intemperiem, aut inflammationes suppuratas, vlcera, atq; corruptelas. Quinetiam à quibusdam venenis, aut medicamentis venenatis, propagatur.

In hac febre cor interdū primario tenetur affectu, interdū alijs visceribus cōsentit, 10. Meth. cap. 8. Plurimæ enim sunt partes siue calida siccaq; intemperie, seu inflammationibus, aut totius substantiæ corruptione, laborent, quæ cordi dein fixum illum calorem imprimunt, vt ventriculus, hepar, pulmo, pectus, mesenterium, intestinum iciumum, colon, vterus, renes, septū transversum, ex quo tamen prius mors, quàm hectica, occupat.

Signa.

Signa hectica.

Calor.

Signa hectica sunt: calor ad primum tactum blandus, perseveranti tamen tactui acer, atq; mordax, & squalorem, seu ariditatem, præferens, quem nihilominus æger, propter æqualem totius intemperiem, cordi consentientem, haud percipiat.

Is ipse

Is ipse calor multò manifestiùs in pul-
pis digitorum, volis manuum, pedum plan-
tis, percipitur.

Proprium verò, & inseparabile, indi-
cium hæcticæ est, quòd febrilis calor, licet
alioquin semper æqualis, sibiq; similis, ho-
ra tamen vna, & altera, post assumptum ei-
bum, quodocunq; tandem is offeratur,
manifestè augeſcat, & emicet, verùm sine
annotatione, quemadmodùm in putridis vo-
luenit, hoc est, sine prægresso horore, fri-
gore, rigore, pandiculatione, &c. & quòd
talis constanter perseueret, donec plena a-
limoniæ distributio fuerit facta, quod Gal.
eodem modo contingere arbitrat, quem-
admodùm calx viua ab aquæ conspersio-
ne exardescit, bullitq;.

Pulsus hæcticarum est debilis, paruus, Pulsus,
durus, frequens; à cibo tamen, vnà cum
ipso calore, per aliquot horas increſcit, &
maior fit, atq; velocior.

Quin & arteria ipsa magis calet, quàm Arteria
partes circumstantes. calet.

Ab vrinis nullum hæcticarum signum Vrina,
desumitur.

Adhæc, diaria, quæ vltra 24. horas pro-
ducitur, hæcticæ gignit suspicionem.

Alter, marasimodes appellata, facile de- Maraf-
prehen- modes.

De febre hectica

prehenditur ex facie Hippocratica, vngui-
um curvitate, & quòd æger quodammodo
vivum sceleton appareat, hoc est, nihil præ-
ter ossa, cuiusq; ostendat, quæ digitis ap-
pressa, pellis siccae modo, consistit, &
rigit.

Prognosis.

IN hecticam propensiores sunt naturæ ca-
lidae siccaeque, vehementius, graciles, &
pauci sanguinis, homines.

Hectica simplex, seu, primæ speciei,
minori labore curatur, quàm cognoscitur:
marasmodos contra, vel tertie speciei hecti-
ca, prorsus est insanabilis; media, prout huic,
aut illi, proprius accedit, aliquando sanatu
facilior, aliquando difficilior, evadit.

Mortis
præfagi-
um.

Mortis iam iam imminenti præfagi-
um est, alui fluxus superueniens, siue colliqua-
tus, seu prostratæ virtutis naturalis affecta.

Curatio.

Scopi cu-
rationis.

SCopi curationis in hectica, quæ sola, si-
ne alterius morbi complexu, substituitur (nā
quæ vel putridam febrem, vel vlcus pulmo-
nis, vt in phthisi coniuncta habet, non tolli-
tur, nisi affectibus illis prius abolitis) quo-
niam

niam causam fouentem non habet, estq; in-
temperies calida; sunt refrigeratio, & hu-
meftatio, non solum per ea, quæ qualitate
humefaciunt, sed & quæ substantificam hu-
miditatem procurant, & eam deperditam
restaurant, quod ea tantum efficiunt, quæ
corpus bene nutriunt.

Porro cum refrigeratio, ceu quæ per effi-
cacissimam, aut (vt loquuntur Scholæ) acti-
uam, qualitatem introducatur, breui admo-
dum perficiatur, periculo tamē haud vacat,
in corporibus præsertim excarnibus, qua-
lia hecticorum, ex alijs morbis huc deuolu-
torum, esse consueuerunt. Moderanda igitur
erit, & magis industriâ humeftationi in-
cumbendum, vtpote cuius actio ignaua est,
& in qua modum excedere non possis.

Materia curatiuis intentionibus ido. Curatio.
nea partim intus, partim foris, corpori oc-
currit.

Intus quidem aër inspirando attractus,
& ea, quæ cibo, potuq; , reficiunt: foris verò
circumsusus aër, & præsidia topica, refrigerantia,
humefctantia: vt, aquæ dulcis balneum. &c. De
singulis seorsim.

Aër sit frigidissimus, vel talis arte pares- Aër.
tur, eo pacto, quo in febre ardente appa-
randum docuimus; ita tamen, vt is respira-

De febre hectica

tionem quidem inferuiat, reliquum verò corpus minimè feriat, quod proinde stragulis bene tectura, & undiquaq; munitum, esse debet. Hyeme oportet eum quadamtenus calefacere vapore aque calentes.

Cibus. Cibus præbeatur boni succi, non facile dissipabilis, neq; etià concoctu difficilior. Talis est vel sponte sua, seu propria natura, vel præparatione

Carnes. euadit talis: vt, pullus, capus, pipio, nephrens; hædina, agnina, vitulina, veruecina; horum animalium pedes; paruus cuniculus, lepus iuuenis; tene-riores aues; oua sorbilia; lac, de cuius usu infra pluribus; pisces saxatiles, & qui ab horum bonitate proximè absunt; trochæ, anguille, in aquis salubribus captæ, & bene præparate; hepata item piscium; testudo nemoralis, cochleæ gambari, cancri, & ranarum coxæ.

Frumenta. Ex frumentaceis cremor hordei commen-
tacea. datur.

Olera. Ex oleribus, endiuiæ, lactuca, spinachia, malua, portulaca, borrago, buglossum.

Fructus. Ex fructibus, poma dulcia, cucurbita, cucumeres, amygdalæ dulces recentes, & nuclei pini eiusdem ætatis, si prius noctem vnam in aqua violarum macerentur.

Nota. Notandum tamen interim, ea quæ in isto catalogo durioris sunt consistentiæ, inter initia morbi, cum vis concoctrix etiam num

num valet, offerenda esse, reliqua postea-
rius.

Elix. cum suo iure absumentur; unde
Hippocrati meritò assatis, ceu promptè
bilescentibus, præferuntur.

Salis verò quàm minimum edulia o-
mnia habeant.

Sal.

Condimentum cibo, cæteris aromatis o-
mnibus abdicatis, parabitur ex croco, vel
succo citri, aut limonum carnibus, inspersum.

Condi-
menta.

Cum carnibus porro perpetuò aliquid Carnibus
elixetur, quod alteret, & (si videatur ne incoquẽ-
cessarium) alimentum reddat stabilius, cu-
iusmodi censentur: prædictorum olerum ali-
quod, hordecum, particula porcelli, pes vituli-
nus.

da.

Ex eadem materia fiet gelatina, vel Gelatina.
hæc ipsa, quemadmodum etiam interiora
carnis assatæ, succi adhuc plenæ, prælo
subijci queunt, indeq; profluens liquor præ-
beri, aut, quod consummatum vocant, con-
fici, deq; eo vnum, aut alterum, cochlear
cæteris fereulis permisceri potest.

Consum-
mata.

Sunt qui hæc ipsa in B. M. destillant, Destillata
gustui quidem non minùs iucunda, viribus
autem multò inferiora.

Suaue, & utile, edulium componitur è
iure pulli, cum emulsione quatuor sem. frigido-

De febre hectica

rum maiorum, & saccharo: aut hordeum ad mol-
litiem discoctum, cum vitello oui, vel cancri be-
ne preparati, mundatiq; cum cremore hor-
dei, amygdalis, & saccharo.

Cancro-
rum &
Gamara-
rum præ-
paratio. Consistit verò cancerorum, & gamara-
rum, præparatio in eo, vt abiectis testis, che-
lis, & pedibus, cum lixiuio, atq; cinere, ad
emendandam odoris fæditatem bene fri-
centur, cum aqua lypida aliquoties ablu-
antur, ac tandem in iure gallinae, aut simili, co-
lixentur.

Cochlea-
rum præ-
paratio. Cochleæ verò ita parantur: Coquun-
tur in aqua, & lixiuio, parùm salitis, dein ab-
lutæ ex aqua, vel hordeato, vel pulli iuscu-
lo, ad mollitiem denuo percoquantur.
Verumenimverò præstat tam cochlearum,
quàm gambarorum, aliorumq; huius gene-
ris, expressum succum vsurpare, quàm car-
nes edere.

Quo respicientes aliqui, pullos offerunt,
carne gambarorum, aut cochlearum, cum tritico,
& hordeo, prius elixâ, nutritos.

Oua. Oua item sordilia multùm conducunt,
vbi, salis vice, saccharo consperguntur.

Oryza. Plurimum quoq; nutrit oryza, cum iu-
re caponis parata, ac pullicula ex amylo, & lacte
amygdalarum.

Panis tri-
ticeus. Adhæc panis triticum ex aqua aliquoti-
es ablu-

es ablutus, & expressus, ac postea cum iure
pulli, capite, adiecta sem. frig. maiorum emul-
sione, & saccharo, percoctus. Vel, si is ipse la-
cti recens multo, citra aliam cocturam, infri-
atus solus edatur.

Cæterum quamvis hectici, ob multam
corporis resolutionem, copioso cibo indi-
geant; quia tamen calor ipsorum debilis ne-
quit illum euincere, consultum est partitis
vicibus parum aliquid offerre, & alimonie
multitudinē frequentia compenlare. Singu-
lis igitur quatuor horis, & semel etiā de no-
cte, aliquid præbebitur; nā vitanda hecticis
est modis omnibus tam fames, quàm sitis.

Potus erit aqua, vel feruefacta solū, Cibus ne-
cticis par-
tiendus.
vel quæ aliquid sacchari adiectum habeat, Potus.
vel in qua bullierit hordeum ad rubedinem
vsq; vel deniq; in magna virium, & ventri-
culi, imbecillitate vinum album, tenue, olya-
gophorum, aqua probè dilutum, aut fonta-
na, aut buglossæ, aut nymphææ.

Vbi alius profluentior est, aquā hordei, & milij
torrefactorū cū gummi Arabico propinabim9 Lac.

Inter ea quæ per os dantur, præter re-
censita edulia, primas meretur lac, quod
manè ab vbere calens protinus hauriri de-
bet. Præfertur autem alijs in hoc genere
(teste Gal. Meth. 12. & 7. lib. cap. 6.) hu-

De febre hectica

Signator
runt aut
coaguli
in ventri-
culo la-
ctis.
Coagus-
lationem
lactis
quid im-
pediat.

Ptisana.

Aqua stil-
lat limas-
cum.
Electua-
ria, &
condita.

manum lac, mulieris sanæ, boni habitus,
duobus circiter mensibus à partu distantis;
deinde asininum, post caprinum, postre-
mo loco vaccinum, dempto iam butyro.
Dosis ab vnc. ij. ad lib. f. & lib. j. dummo-
do in ventriculo non coaguletur, aut cor-
rumpatur, velut innotescit ex ructu acido,
fatido, amaritudine oris, febris, ac sitis, in-
cremento, pulsu maiore, celeniore, & lotio
coloratiore.

Coagulationem porrò lactis in stom-
acho impedit tantillum sacchari adiectum.
Præsentem autem diarrhæa minimè ex-
hibendum est lac, nisi prius ignitis filicibus
vstulatum.

Cæterum ab assumpto lacte neq; in-
dormiendum, neq; alius vel cibus, vel po-
tus, quatuor horarum spatio ingerendus.

lis porrò, qui per Aph 64. sect. 5. ab
usu lactis arcentur, commodum præbebi-
mus ptisanam ex iure pulli per se, aut elixatis in
eo prius præparatis cancris. Quantitas eius est
vnc. v. cum vnc. f. syr. viol.

Aliqui celebrant aquam stillatitiam limas-
cum, cum eiusmodi quopiam syrupo datam.

Electuaria, condita, aliasq; instaurantium
medicamentorum formulas, de industria hic,
ceu passim apud auctores obuias, silentio
inuoluimus.

De ijs,

Lib. Caput xxiii.

85

De ijs, quæ forinsecus adhibentur, hu. Balneum
 mestantibus, refrigerantibus, præfidiis, Ga-
 lenus balneo plurimum tribuit lib. 10 Meth.
 cap. 10. Si tamen absint, quæ illius vsum in-
 hibere possunt: vt, inflammatio interna,
 aut visceris alicuius præstantioris insigni-
 ordebilitas, alui fluxus, cruditas, & febris
 putrida. Erit autem id è dulci aqua com-
 paratum, calidiusculum, non vsq; adeò ta-
 men, vt sudorem proliciat. Trallianus 12.
 lib. cap. 4. lactis more, repentem balnei a-
 quam exigit, cui paulatim affundenda est
 frigida, aut eovsq; illic desidendum, donec
 sponte sua refrigeretur. Poterit autem, vbi
 vires consentiunt, bis die adhiberi, sed, ante
 balnei ingressum tribus, quatuorue, horis
 aliquid cibi coctu facilioris æger delibau-
 rit oportet, ne animo linquat. Sunt qui a-
 quæ balneo defunatæ incoquunt lactucam,
 violariam, nymphæam, caput, & pedes ari-
 etinos, vitulinos.

Postquam balneare desijt, vngetur se-
 cundum spinam, & pectus maxime, oleo
 violarum, & amygdalarum dulcium, buty-
 rone recenti. Aut:

℞. Ol. amygd. dulc. vel communis recentis,
 non saliti, lib. iij.

Vini albi dulcis lib. f.

Vnguentum.

Aque

De febre hectica

Aque simplicis q. s. Infundantur

Foliorum lactuce,

Maluæ, an. M. j.

Violarum M. s.

Rosarum recent. vel earum quæ post de-

stillationem supersunt. P. ij. Co-

quantur in vase duplici ad exhalationē vi-
ni, & aquæ, quod reliquum est exprimatur.
Hoc vnguine illinantur molliter partes pri-
mum infernæ, mox & supernæ.

Ad cætera topica quod atinet, cogni-
tum prius habere oportet locum primo af-
fectum, seu, à quo hectica, vt fonte, propa-
gatur: non enim semper à corde ipso inci-
pit, licet cor necessario afficiatur, vt dictū
fuit. Illi igitur parti, quæ cor in sympathiam
pertrahit, suaq; calidiori dyscrasia febri hu-
ic occasionem præbet, siue sit ventriculus,
siue hepar, &c. ea applicabimus, quæ ardo-
rem, squaloremq; , attemperant, cuius ge-
neris reputantur: Vng. refriger. Galeni, farina
itei hordei, succo portulacæ, lactucæ, aut sem-
peruini maioris, in cataplasmatibus formam reda-
cta, quæ subinde vbi incaluerit scilicet, per-
mutare conuenit.

Epithe-
mata,

Huc etiam reuocari merentur epithe-
mata in tractatione febris ardentis proposi-
ta; sed acetum est omittendum.

Præ-

Lib. Caput xxiii.

85

Præparantia, purgantia, venæ sectio,
nullum in hoc morbi genere locum ha-
bent. Opportuni tamen sunt chysteres parati
ex solo lacte caprino, aut optimo iure carnis;
vel cremore hordei cum vnc. iij. iij. flor. cassie
in adstrictiore aluo: vel componuntur etiã
e butyro rec. mucilagine cydoniorum, iusculo
caponis, aut decocto lactuce, violariæ, vitello oui,
& saccharo.

Somnus indulgetur bene longus.

Animus esto tranquillus, & moderato
modoq; perfundatur gaudio, omnes alios
graviore affectus fugiendo.

Corpori quoq; ab exercitatione vaca-
tio, & quies, adeo est necessãria, vt Gal. lo-
co citato malit ægrum in balneum depor-
tari, quàm eò pedibus descendere. Hæc
de febre hectica, alijsq; tam simplicibus,
quàm compositis, febribus, ad Omnipoten-
tius Dei immortalem gloriam dicta

sint satis.

Kkk






Errata corrige.


Fol. 30. Pro calore tincta est, lege colore &c

Fol. 49. Is igitur instaurandis, lege Iis
igitur &c.

Fol. 67. Petrus Sarius, lege Petrus Salius.

Cætera, si quæ reperientur, tanquã
leuia, facile lectio ipsa emendabit.







Printed and Published by
J. H. B. & Co. 111 N. 3rd St. St. Louis, Mo.


ore &c
lege lis

Salius.
anquã

1. Die ersten beiden Jahre sind
 2. Die ersten beiden Jahre sind
 3. Die ersten beiden Jahre sind
 4. Die ersten beiden Jahre sind
 5. Die ersten beiden Jahre sind
 6. Die ersten beiden Jahre sind
 7. Die ersten beiden Jahre sind
 8. Die ersten beiden Jahre sind
 9. Die ersten beiden Jahre sind
 10. Die ersten beiden Jahre sind







Pinget Rens
R. Philonum Manitarum My
Et bene bene in ambo
suis Voz erit resurrectio
carnis Sic sudorem lacrimas
et lacus eris

Recipe

~~Sacra et Sacra Antopem a~~
~~medicorum ferebatur~~

Recipe
R. elgatus in h. pres

R.

In celo sine matre uide
ra sine patre genit
patrem et cognoscere
uxorem et uxorem
genit uxorem pa
mei

stdr0025649

